UNIDAD DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DEL ADULTO

COMUNICACIÓN INTERAURICULAR

Edición nº 3

Revisión cada 5 años

<p><u>Realizado</u> Dra Pilar Escribano Dra Jimenez Dra. Ruiz Cano Dra. Velazquez Dr. Hernández Dra. López Gude</p> <p>Fecha: Enero-2008</p>	<p><u>Revisado</u> Dra. Teresa Segura de la Cal Sesión de Cardiopatías Congénitas del Adulto</p> <p>Fecha: Mayo 2019</p>	<p><u>Aprobado</u> Sesión de Cardiopatías Congénitas del Adulto</p> <p>Fecha: Mayo 2019</p>
--	--	---

INDICE

1. Diagnóstico	3
2. Indicaciones de cierre de CIA	5
3. Cirugía de CIA	6
4. Seguimiento	7
Bibliografía	9
Indicadores de adhesión	10
Control de cambios	10

<p>CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DEL ADULTO</p>	<p>PROTOCOLO DE LA COMUNICACIÓN INTERAURICULAR</p>	<p style="text-align: center;">Ed. 3</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Página 3 de 10</p>
--	---	--

1- DIAGNOSTICO

Es necesario:

- Documentar tipo y presencia de CIA
 - Ostium primum
 - Ostium secundum
 - Seno venoso (superior, inferior, seno coronario)
 - Aurícula común
- Diámetro de los defectos (en general >10 mm, > 1/3 del tabique)
- Repercusión funcional:
 - Flujo del cortocircuito (Qp/Qs)
 - Tamaño y función del VD
 - Tamaño de AD
 - Si la presión pulmonar esta elevada, calcular resistencias vasculares pulmonares.
- Identificar patología asociada (drenaje venoso anómalo, enfermedad valvular o coronaria asociada)

El estudio de los pacientes incluirá:

- Historia clínica
 - Clase funcional
 - Arritmias (flutter, FA..)
 - Embolismo paradójico (ACVA)
 - Insuf cardiaca
 - Signos y síntomas de hipertensión pulmonar (desaturación sistémica..)
- ECG y Rx de torax
- Ecocardiograma transtorácico y transesofágico
- Saturación de oxígeno basal
- Cateterismo
 - Si la presión pulmonar está elevada se determinará RVP, QP/QS y reactividad pulmonar y comportamiento hemodinámico tras cierre transitorio de CIA. Disipar dudas de drenaje venoso.
 - Coronariografía, varón >40 años/mujer >45 años si se planea abordaje Q.
- Resonancia Magnetica: En casos conflictivos por sospecha de lesiones asociadas no delimitadas o datos discrepantes en otras tecnicas diagnosticas utilizadas.
- Comportamiento de la saturación de oxígeno en el ejercicio si existe HTP.

PROTOCOLO DE ESTUDIO ECOCARDIOGRÁFICO:

Ecocardiograma Transtorácico

- Tipo de CIA
 - Ostium primum
 - Ostium secundum
 - Seno venoso
 - Seno coronario

<p>CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DEL ADULTO</p>	<p>PROTOCOLO DE LA COMUNICACIÓN INTERAURICULAR</p>	<p>Ed. 3</p> <hr/> <p>Página 4 de 10</p>
--	---	--

- Tamaño de la CIA (medido en el plano con mejor definición de los bordes, generalmente subcostal)
- Tamaño del VD (Diámetro diastólico)
- Grosor del VD
- Funcion sistolica del VD (Subjetiva)
- Tamaño y función del VI (FE Teicholz)
- Tamaño de la AD (área)
- Tamaño de la Arteria pulmonar
- Cuantificación del cortocircuito: QP/QS
- Dirección del cortocrcuito (Doppler color)
- Presión sistólica pulmonar
- Severidad de insuficiencia tricúspide (I-IV)
- Severidad de la Insuficiencia pulmonar (I-IV)
- Lesiones asociadas (prolapso, cleft)
- Si dudas: verificación de la existencia de CIA con contraste salino agitado i-v

Ecocardiograma Transesofágico

- Tipo de CIA
- Tamaño de CIA
- Dirección del cortocircuito
- Estudio de drenajes venosos pulmonares
- Valoración del cierre percutáneo
 - Tipo de CIA : OS
 - Tamaño máximo de la CIA < 40 mm (ideal $\leq$ 20mm) (0° y 90°). ETE infraestima tamaño

<p>Hospital Universitario 12 de Octubre SaludMadrid Comunidad de Madrid</p> <p>CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DEL ADULTO</p>	<p>PROTOCOLO DE LA COMUNICACIÓN INTERAURICULAR</p>	<p>Ed. 3</p> <hr/> <p>Página 5 de 10</p>
---	---	--

- Medicion de bordes de la CIA
 - Anteroinferior (0°)
 - Posterosuperior (0°)
 - Anterosuperior (aórtico) (0-30°)
 - Superior (90°)
 - Posteroinferior (90 °)
 - Distancia al seno coronario (0°)
 - Distancia a la vena pulmonar supdcha (90-110°)

Si ≤ 3 mm : NO cierre percutáneo (salvo anterosuperior aórtico)

Si 3-5 mm: Discutible . NO si posteroinferior < 5mm.

Si ≥ 7 mm : IDEAL

2- INDICACIÓN DE CIERRE DE CIA

Indicaciones de cierre de CIA

- Toda CIA con QP/QS >1.5 Si el cierre es quirúrgico QP/QS >2.
- Toda CIA con repercusión hemodinámica (HVI puede incrementar el shunt)
- Toda CIA con historia previa de embolias.

En presencia de hipertensión pulmonar (presión sistólica pulmonar >70 mm Hg y/o RVP> 5 UW)

1. CIA Restrictiva (menor de 2cm) con HP severa

- CIA tipo OS: Presión sistólica pulmonar < 2/3 presión sistémica arterial y RVP < 2/3 RVS . Ambas condiciones con QP/QS > 1.5. Observar comportamiento hemodinámico tras cierre transitorio del defecto. Los parámetros hemodinámicos tienen que evolucionar favorablemente (Presión pulmonar y RVP descenden > 30%, manteniendo el GC)
 - Modificación de la presión pulmonar y sistémica
 - Saturación de oxígeno en AP
 - RVP y RVS
 - Presión en aurícula derecha y GC.
- Sino es factible el cierre transitorio se realizara test agudo vasodilatador con epoprostenol

2. CIA no restrictiva

- CIA tipo OS: Presiones pulmonares en rango sistémico. Ambas condiciones con QP/QS > 1.5. Observar comportamiento hemodinámico tras cierre transitorio del defecto. Los parámetros hemodinámicos tienen que evolucionar favorablemente (Presión pulmonar y RVP descenden > 30%, manteniendo el GC)
 - Modificación de la presión pulmonar y sistémica
 - Saturación de oxígeno en AP

<p>Hospital Universitario 12 de Octubre SaludMadrid Comunidad de Madrid</p> <p>CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DEL ADULTO</p>	<p>PROTOCOLO DE LA COMUNICACIÓN INTERAURICULAR</p>	<p>Ed. 3</p>
		<p>Página 6 de 10</p>

- RVP y RVS
- Presión en aurícula derecha y GC.
- CIA en otra localización o CIA tipo OS cuando no es posible cierre percutaneo : Presión sistólica pulmonar < 2/3 presión sistémica arterial y RVP < 2/3 RVS . Ambas condiciones con QP/QS > 1.5 en situación basal o tras estudio de reactividad pulmonar (epoprostenol,oxido nítrico...). Las modificaciones para ser valorables > 30% y el cociente RVP <1/2 RVS. La cifra final de RVP será siempre inferior a 7 UW

3- CIRUGIA de la CIA

Cirugía de las arritmias

○ **FA paroxística**

Estará indicado aun en el caso de estar en ritmo sinusal en el momento de la cirugía.

Técnica quirúrgica: Ablación alrededor de las venas pulmonares con alguna de las fuentes de energía disponibles (radiofrecuencia, ultrasonidos)

○ FA permanente

Contraindicaciones:

- Aurícula izquierda muy dilatada (> de 6 cm)
- Disfunción ventricular
- Reintervención
- Cirugía técnicamente complicada con tiempos de isquemia largos (reparaciones valvulares.....)

Técnica quirúrgica: Ablación de la aurícula izquierda y derecha.

Manejo postoperatorio:

○ La monitorización consistirá en:

- Línea de presión arterial.
- Línea venosa central.
- Presión en aurícula izquierda.
- Presión arterial pulmonar en aquellos enfermos con hipertensión pulmonar en el peroperatorio.

Problemas característicos del postoperatorio

○ Disfunción de nodo sino-auricular

La causa es el daño directo o la interrupción de la arteria que lo irriga.

Se manifiesta en la respuesta inadecuada a la anemia, las drogas inotrópicas y en la presencia de arritmias auriculares o ritmos de la unión.

Es más frecuente en la CIA tipo seno venoso.

○ Síndrome postpericardiotomía

El conjunto de síntomas engloba: fiebre, limfocitosis, náuseas, vómitos o dolor abdominal. Se manifiesta en los primeros días o semanas tras la cirugía.

A la exploración física puede existir roce pericárdico, taquicardia e incluso compromiso hemodinámico.

El ecocardiograma debe descartar la presencia de derrame pericárdico.

Tratamiento: Antiinflamatorios por vía oral durante 10 días (Inacid 1c/8h)

Pericardiocentesis

○ Disfunción ventricular izquierda

La causa es la consecuencia de la dilatación crónica del ventrículo derecho cuando esta existe antes de la cirugía. La sobrecarga crónica de volumen en el ventrículo derecho ocasiona disminución

<p>CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DEL ADULTO</p>	<p>PROTOCOLO DE LA COMUNICACIÓN INTERAURICULAR</p>	<p>Ed. 3</p> <hr/> <p>Página 7 de 10</p>
--	---	--

en la compliance del ventriculo izquierdo. El cierre de la CIA conlleva en estas circunstancias una elevación repentina de la presión en la aurícula izquierda y edema pulmonar.

Tratamiento: Inotrópicos y/o vasodilatadores que disminuyan las postcarga.

○ Hipertensión pulmonar

Oxido nitrico en el postoperatorio (20-40 ppm).

Valoración de necesidad de tratamiento crónico según severidad y repercusión de la HP residual

○ CIA residual

Tratamiento: reintervención si Qp/Qs >1,5

○ Obstrucción a las venas pulmonares

Se manifiesta por el edema intersticial local presente en la radiografía de tórax.

Tratamiento: reintervención.

○ Bloqueo auriculo-ventricular

Puede ocurrir tras el cierre de CIA tipo seno coronario.

Tratamiento: Marcapasos transitorio o permanente.

4- SEGUIMIENTO

Seguimiento:

- Toda CIA con cierre percutaneo
- Toda CIA que se ha cerrado en la edad adulta (>25 años)
- Toda CIA con cardiopatias acompañantes (disfunción ventricular, enfermedad coronaria, Hipertensión pulmonar, arritmias)

Anticoagulación:

- Antiagregación con aspirina los 6 primeros meses tras el cierre
- Pacientes >40 años con dilatación auricular ---- Anticoagulación 6 m, si se objetiva estabilidad del ritmo sinusal, suspender (alto riesgo de FA)
- Siempre que se documente FA.

Profilaxis de endocarditis: Los 6 primeros meses tras el cierre percutaneo.

Embarazo:

- Bien tolerado en pacientes con CIA
- Complicaciones son de naturaleza emboligena en CIAS no operadas.
- Contraindicación en presencia de hipertensión pulmonar.
- Posibilidad de recurrencia en el hijo -3-5%.

Periodicidad del seguimiento.

- CIA sin complicaciones y en pacientes jóvenes:
 - 1 mes tras la reparación con ETT (realizado 24-48 postprocedimiento)
 - 1 año tras la reparación con ETT
 - Bianuales con ETT cada 5 años, en ausencia de complicaciones significativas
- CIA en >40 años
 - 1 mes tras la reparación con ETT(realizado 24-48 postprocedimiento)
 - 6 m tras la reparación con ETT si HP >50 mm Hg
 - Anuales con ETT cada 5 años en ausencia de complicaciones significativas y ETT anual si HP >50 mm Hg.

<p>CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DEL ADULTO</p>	<p>PROTOCOLO DE LA COMUNICACIÓN INTERAURICULAR</p>	
		<p>Ed. 3</p>
		<p>Página 8 de 10</p>

ECOCARDIOGRAMA SEGUIMIENTO POSTCIERRE

Calendario:

- 24-48 h post cierre percutáneo
- 1 semana post cierre quirúrgico
- 6º mes post cierre si HTP previa (> 50mmhg)
- 1º año post-cierre CIA.
- Cada año si HTP residual (> 50 mmHg)
- Cada 5 años si no hay HTP residual

- Tamaño del VD (Diámetro diastólico)
- Funcion sistolica del VD (Subjetiva)
- Tamaño y función del VI (FE Teicholz)
- Presión sistólica pulmonar
- Severidad de insuficiencia tricúspide (I-IV)
- Severidad de la Insuficiencia pulmonar (I-IV)
- Valoración del Amplatzer (cierre percutáneo)
 - Alineación
 - Shunt residual
 - Valoración posibles complicaciones: estenosis vena pulmonar, disfunción mitral etc
- Valoración postcirugía
 - Shunt residual
 - Reparación de cleft mitral

<p>CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DEL ADULTO</p>	<p>PROTOCOLO DE LA COMUNICACIÓN INTERAURICULAR</p>	<p>Ed. 3</p> <hr/> <p>Página 9 de 10</p>
--	---	--

BIBLIOGRAFÍA

- Viswanathan S. and Kumar K. Assessment of operability of congenital cardiac shunts with increased pulmonary vascular resistance. *Catheter Cardiovasc Interv* 2008; 71:665-670.
- Balzer et al. The INOP test study group. *Circulation*. 2002;106[suppl I]:I-76-I-81.
- Lopes AA and O’Leary PW. Measurement, interpretation and use of hemodinamyc parameters. *Cardiol Young* 2009; 19 (S1):8-12.
- Galiè N. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. *Eur Heart J*. 2016;37:67–119.
- Stout KK, Daniels CJ, Aboulhosn JA, Bozkurt B, Broberg CS, Colman JM, Crumb SR, Dearani JA, Fuller S, Gurvitz M, Khairy P, Landzberg MJ, Saidi A, Valente AM, Van Hare GF, 2018 AHA/ACC Guideline for the Management of Adults With Congenital Heart Disease, *Journal of the American College of Cardiology* (2018), doi: 10.1016/j.jacc.2018.08.1029
- Brida M, Gatzoulis MA. Pulmonary arterial hypertension in adult congenital heart disease. *Heart* 2018;104:1568–1574
- Van der Feen DE, et al. Assessment of reversibility in pulmonary arterial hypertension and congenital heart disease. *Heart* 2019;105:276–282.

<p>CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DEL ADULTO</p>	<p>PROTOCOLO DE LA COMUNICACIÓN INTERAURICULAR</p>	
		<p>Ed. 3</p>
		<p>Página 10 de 10</p>

INDICADORES DE ADHESIÓN

Indicador

ETE en pacientes con indicación de cierre x 100/pacientes tratados con cirugía o intervencionismo

Estándar: 100%

Indicador

Pacientes con indicación de cierre presentados en sesión x 100/pacientes tratados con cirugía o intervencionismo

Estándar: 100%

CONTROL DE EDICIONES			
FECHA	HOJA/S	CAUSA DEL CAMBIO	
Enero 2008	Todas	Edición inicial	
Abril 2013		Actualización	
Mayo 2019		Revisión para la evaluación externa Indicadores de adhesión	