


PRECAUCIONES SINDRÓMICAS EMPÍRICAS

Síndrome	Precauciones empíricas recomendadas	Etiología posible	Precauciones recomendadas tras identificación del germen	Duración del aislamiento
Diarrea	De contacto	Patógenos entéricos	De contacto	Duración de la enfermedad Toxina Cl. dif: enfermedad + 48h
Infección respiratoria	Por gotas (si sospecha tuberculosis o COVID-19, ver recomendaciones específicas)	VRS, parainfluenza y metapneumovirus	De contacto	Duración de la enfermedad
		Rinovirus, influenza Adenovirus	Por gotas Por gotas + contacto	Rino y adeno: duración de la enfermedad Influenza: 7 días tras el inicio de los síntomas (5 días si tratamiento) o 24h tras la resolución de la fiebre y síntomas respiratorios.
		Bordetella pertussis	Por gotas	5 días con tratamiento
		COVID-19	Por gotas + contacto	Duración enfermedad y PDIA negativa si a partir del 7° día
		Tuberculosis	Respiratoria	3 semanas de tto + 3 esputos negativos Familia: hasta descartar enfermedad
Meningitis	Por gotas + contacto *Solo aislamiento respiratorio si contexto clínico sugerentes de etiología tuberculosa	Meningococo, Haemophilus influenzae tipo b	Por gotas	Hasta 24 horas tras el inicio del tratamiento antibiótico
		Enterovirus	De contacto	Duración de la enfermedad
		Tuberculosis	Respiratorio (más contacto si drenaje de material infectado)	Hasta descartar tuberculosis pulmonar en familiares.
Exantema petequial	Por gotas	Meningococo	Por gotas	Hasta 24 horas tras el inicio del tratamiento antibiótico
Exantema vesicular	Respiratorio + contacto	Varicela o Herpes Zóster	Respiratorio más contacto	Hasta que todas las lesiones sean costras
		Herpes simple	Contacto	
Riesgo de infección por germen multirresistente	De contacto	Gérmenes multirresistentes	De contacto (Habitación individual)	Ver tabla específica

TIPOS DE AISLAMIENTO

Tipo de aislamiento	Higiene de manos	Guantes	Mascarilla	Protectores oculares	Bata	Ubicación	Tipo de aislamiento
De contacto Diarrea VRS	Con productos de base alcohólica salvo: <ul style="list-style-type: none"> Suciedad visible o Contacto con pacientes infectados por microorganismos productores de esporas como <i>Clostridium difficile</i> En estos casos se recomienda lavado con agua y jabón.	Guantes SOLO si riesgo de contacto con sangre, fluidos corporales (no incluye sudor), piel no integra o mucosas.	Si existe riesgo de salpicaduras con sangre o fluidos corporales			Habitación individual, ingreso en cohortes o separación >1metro	De contacto Diarrea VRS
Por gotas Gripe Meningococo	<h1 style="text-align: center;">Sus 5 Momentos para la Higiene de las Manos</h1> 	* Importante recordar que: <ul style="list-style-type: none"> Precisan lavado de manos antes y después de su uso. Deben cambiarse entre procedimientos en un mismo paciente. Deben cambiarse de un paciente a otro. 			(Si gérmenes entéricos, recomendable no compartir baño)	Por gotas Gripe Meningococo	
Respiratorio Varicela Tuberculosis Sarampión				 FFP2	Si existe riesgo de salpicaduras con sangre o fluidos corporales	Habitación individual	Respiratorio Varicela Tuberculosis Sarampión