

Tabla información y preparación pruebas

<b>NOMBRE DE LA PRUEBA</b>	<b>ENEMA OPACO</b>
<b>SERVICIO</b>	<b>RADIODIAGNÓSTICO</b>
<b>CONCEPTO</b>	El enema opaco es una exploración con rayos X que permite visualizar el intestino grueso mediante varias radiografías en distintas posiciones, administrando a través del recto (previa colocación de una sonda) un contraste visible a los rayos X. Su duración es de unos 20-30 minutos.
<b>INDICACIONES</b>	Patología diversa del Intestino grueso: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sospecha de cáncer de colon.</li> <li>• Diverticulosis, Trastornos de la motilidad, etc.</li> </ul>
<b>OBSERVACIONES Y PRECAUCIONES</b>	Contraindicada en mujeres gestantes, por el uso de rayos X sobre el abdomen.
<b>CONSENTIMIENTO INFORMADO</b>	NO
<b>PARÁMETROS QUE ES PRECISO CONOCER</b>	Fecha de la última menstruación.
<b>INFORMACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PACIENTE</b> (esto linkado a otra hoja que se entregaría al paciente)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es muy <b>importante</b> que siga la siguiente preparación, que incluye <u>dieta*</u>:</li> <li>• Durante los <b>dos días anteriores</b> a la prueba no podrá tomar nada, excepto la dieta que aparece abajo.</li> <li>• El día anterior a la exploración comenzara a tomar el preparado <b>SOLUCIÓN EVACUANTE BOHM</b> con un ritmo aproximado de un sobre monodosis cada 20 minutos, hasta tomar 16 sobres (4 litros). Horario de las tomas: de 5 de la tarde a 9 de de la noche. Si tolera mal la velocidad de ingesta de la solución evacuante puede tomarse los sobres cada 30 minutos.</li> <li>• Para la preparación de la <b>SOLUCIÓN EVACUANTE BOHM</b>: verter el contenido de un sobre en el vaso dosificador, añadir agua hasta el nivel (250 ml.) y agitar hasta lograr la disolución total del polvo.</li> <li>• <u>Ponerse un enema Cassen de 250 c.c. la noche anterior (antes de acostarse) y otro por la mañana (2 horas antes de venir al hospital).</u></li> <li>• En la cena, hacer dieta muy ligera y desde las 12 de la noche (del día anterior) no podrá comer y podrá beber un máximo de dos vasos de agua sin gas hasta que se haga el estudio radiológico. Si deben tomar medicación, pueden hacerlo, en su horario habitual.</li> <li>• Avisará antes de la prueba en el caso de que sea alérgico a algún medicamento.</li> </ul> <p><b>DEBE SEGUIR DURANTE LOS DOS DÍAS ANTES UNA DIETA SIN RESIDUOS, CONSISTENTE EN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CALDO DE VERDURA FILTRADA O SOPA DE TAPIOCA.</li> <li>• ARROZ O PASTA.</li> <li>• CARNES MAGRAS COCIDAS SIN GRASA O A LA PLANCHA.</li> <li>• PESCADOS BLANCOS COCIDOS SIN GRASA O A LA PLANCHA.</li> <li>• QUESOS DUROS.</li> <li>• ZUMOS DE NARANJA SIN PULPA.</li> <li>• BISCOOTES, GALLETAS, MIEL O JALEA.</li> <li>• MANTEQUILLA CRUDA, CAFÉ, TÉ O TISANAS LIGERAS.</li> <li>• AGUA SIN GAS.</li> </ul>