

VACUNACIÓN POR GRUPOS DE RIESGO EN PERSONAS ADULTAS ≥ 18 AÑOS

2023



	Inmunodeprimidos (excluidos VIH)	VIH		Enfermedad cardiovascular y respiratoria crónica. Diabetes	Enfermedad hepática crónica. Alcoholismo crónico	Insuficiencia renal crónica. Hemodiálisis	Asplenia, déficit complemento tratamiento con eculizumab	Embarazo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Hombres y mujeres en situación de prostitución	Mujeres con tratamiento escisional de cérvix	Contactos familiares y cuidadores de inmunodeprimidos	Profesionales sanitarios	Trasplantados progenitores hemotopoyéticos	Trasplante órgano sólido
		CD4<15% O <200µl	CD4≥15% O >200µl												
Hepatitis B	4 dosis	4 dosis			3 dosis	4 dosis			3 dosis	3 dosis			3 dosis	4 dosis	4 dosis
Tétanos-difteria	Vacunar o completar vacunación hasta 5 dosis														
Difteria-Tétanos- Pertussis								1 dosis					1 dosis ^(a)	4 dosis ^(b)	1 dosis ^(c)
Haemophilus influenzae b							1 dosis							4 dosis	
Neumococo conjugada	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis							3 dosis	1 dosis
Menigococo A, C, W, Y		2 dosis					2 dosis							2 dosis	
Sarampión- Rubeola-Parotiditis	X	X	2 dosis ^(d)					X				2 dosis ^(d)	2 dosis ^(d)	X	X
Varicela	X	X	2 dosis ^(d)					X				2 dosis ^(d)	2 dosis ^(d)	X	X
Virus del Papiloma Humano		3 dosis ^(e)							3 dosis ^(e)	3 dosis ^(e)	3 dosis			3 dosis	3 dosis
Herpes Zóster		2 dosis												2 dosis	2 dosis
Hepatitis A		3 dosis ^(f)	2 dosis		2 dosis				2 dosis	2 dosis			2 dosis ^(g)		
Meningococo B							2 dosis							2 dosis	
Gripe	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis				1 dosis	1 dosis	1 dosis	1 dosis

- (a) Áreas pediátricas de riesgo.
- (b) Se recomienda vacunación con DTPa de alta carga. En estos pacientes se acepta el uso de vacuna pediátrica hexavalente en todas las edades.
- (c) Si no vacunado en los últimos 10 años.
- (d) Si susceptible (no haber pasado la enfermedad o no vacunado con 2 dosis).
- (e) Hasta los 26 años de edad.
- (f) 3 dosis si CD4 < 350mm³.
- (g) 2 dosis en trabajadores sanitarios que trabajan en entornos de riesgo o tienen factores de riesgo: mayores de 50 años susceptibles, hepatópatas crónicas o candidatos a trasplante hepático, inmunodeprimidos, personal de laboratorio en contacto con el VHA.
- X Vacuna contraindicada.