

Area de Laboratorio	INSTRUCCIÓN PARA EL PACIENTE	IP - LGE - 017
	TIEMPO DE HEMORRAGIA	Página 1 de 2

1. Breve Información:

Este procedimiento consiste en realizar una pequeña incisión de 1 cm de largo y 1 mm de profundidad en la cara anterior de un antebrazo, mediante un dispositivo estéril y de un solo uso que no causa dolor.

2. Preparación del paciente previa a la prueba:

2.1 Pautas terapéuticas

La realización de la prueba durante un tratamiento con aspirina o antiinflamatorios interfiere con los resultados y no es valorable.

Por tanto, en caso de que Vd. esté tomando alguno de estos medicamentos consulte con su médico la posibilidad de suprimirlo durante los 7 días previos a la realización de la prueba.

Si no fuera posible, anote la medicación que su médico aconsejó no retirar en el apartado 4 del final de este documento.

2.2 El día de la prueba

No debe aplicarse crema u otros ungüentos en los antebrazos; si trae manga larga, debe poderse subir con facilidad sin que le oprima el brazo.

Entregue al personal de extracciones de laboratorio este documento debidamente cumplimentado.

3. Durante la realización de la prueba

Al final de la prueba se le colocará una pequeña gasa que puede retirar al día siguiente.

Le notificamos que le quedará una fina cicatriz en la zona de incisión.

4.- Observaciones del paciente:

- **Nombre:** **Fecha:**
- **¿Ha tomado alguna medicación durante el período de recogida?**
 SI **NO**
- **En caso afirmativo, por favor, indique cual:**

- **Otras informaciones de interés:**

- **Firma del paciente o tutor:**