

2022

| | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Planta del mes | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |

Frankenia pulverulenta L.



| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| HOJAS | | | | | | | | | | | | |
| FLORES | | | | | | | | | | | | |
| FRUTOS | | | | | | | | | | | | |



¿Cómo es?

Frankenia pulverulenta es una herbácea postrada anual que mide hasta 20 centímetros de altura. **Tallos** a veces lignificados en la base, de (2) 5 a 17 (30) centímetros, postrados, rara vez ascendentes, ramificados, glabros o puberulentos; los pelos del tallo y el envés son siempre estrechos, agudos, no espatulados. **Hojas** opuestas, de hasta 8 milímetros, de obovadas a oblongo-espatuladas, a veces algo redondeadas o emarginado-escotadas, planas o algo revolutas y algo plegadas sobre el envés por el nervio medio cuando maduran. Pecíolo bien diferenciado, ensanchado en la parte inferior, con cilios en los márgenes. **Flores** solitarias, axilares, o bien en inflorescencias cimosas laxas terminales. Cáliz (2) 2,5 - 4 (5) mm, con costillas y espacios intercostales glabros o con pelos anchos esparcidos, raras veces un poco puberulentos. Pétalos 3,5-5 mm, cuya longitud es, de ordinario, el doble de la del cáliz, obovados, rosados o violáceos, con lígula muy corta. Cápsula polisperma.

¿Dónde podemos encontrarla?

Frankenia pulverulenta es una hierba anual de distribución mediterránea,, irano-turánica, sáhara-arábica y paleotropical. En España está bastante repartida; también en Baleares y en Canarias. En la Comunidad de Madrid hay citas antiguas de Cutanda en terrenos yesosos y saladares cerca de la Puerta de Toledo, o de Jesús Izco en Rivas-Vaciamadrid de los años setenta, hoy extinguidas por el desarrollo urbanístico; no obstante, sigue viviendo en numerosos ambientes salinos del sur y sureste. En el Parque Regional del Sureste se encuentra en bastantes puntos de los municipios de Ciempozuelos, Valdemoro y Aranjuez.

¿Cuál es su hábitat?

Indicadora de ambientes salinos, marítimos o de interior, en depresiones salobres endorreicas, el "alcohol" o "saladillo negro", de la familia Frankeniaceae, crece en pastizales anuales subnitrofilos sobre suelos salinos.

¿Grado de protección?

Carece de protección en la Comunidad de Madrid. Aunque no está extendida por su geografía, sus poblaciones se ubican dentro de los límites del PRSE y protegidas por la legislación que regula este espacio. En algunos puntos de España, como Cataluña y Aragón, parece estar en expansión.

¿Sabías que?

Linneo creó el género en honor de Johannes Frankenius (1590-1661), médico y botánico en Upsala y autor del primer inventario de la flora sueca, el *Speculum botanicum* (1659).

El epíteto específico viene del latín *pulvis, pulveris* (polvo), debido al aspecto combinado que le confieren la sal que exuda por el haz de las hojas y por su envés puberulento.

En el interior peninsular, debido al clima continental y la recesión del verano, termina la floración en el mes de julio, pero en la costa, con clima mucho más benigno, florece hasta septiembre.



Parque Regional del Sureste

PARQUE REGIONAL DEL SURESTE

Flora de saladares