

Código de ensayo	Título del ensayo	Estado	Tipo de ensayo	Situación clínica
GS-US-352-1214	A phase 3, randomized study to evaluate the efficacy of momelotinib versus best available therapy in anemic or thrombocytopenic subjects with primary myelofibrosis, post-polycythemia vera myelofibrosis, or post-essential thrombocythemia myelofibrosis who were treated with ruxolitinib	Cerrado	Ensayo de Fase III	2ª Línea o sucesivas
ASTX727-02	Estudio de fase 3, abierto, aleatorizado, cruzado de astx727 (asociación de dosis fijas de cedazuridina y decitabina) en comparación con decitabina i.v. En sujetos con síndrome mielodisplásico (smd), leucemia mielomonocítica crónica (Immc) y leucemia mieloide aguda (Ima).	Abierto a inclusión	Ensayo de Fase III	
CAMN107I2201	Estudio multicéntrico, de un único brazo, de remisión libre de tratamiento de nilotinib, en pacientes con leucemia mieloide crónica en fase crónica con bcr-abl1 positivo, que han alcanzado un estado de enfermedad residual mínima (erm) duradera con tratamiento de primera línea con nilotinib	Cerrado a inclusión en seguimiento	Ensayo de Fase II	1ª Línea
GEM-MIE-2014-01 (TRATABILIDAD)	Estudio observacional prospectivo para identificar los aspectos clínicos que conducen a la toma de decisiones terapéuticas en pacientes con mielofibrosis	Abierto a inclusión	Observacion al prospectivo	1ª Línea o sucesivas
GS-US-352-1214	A PHASE 3, RANDOMIZED STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY OF MOMELOTINIB VERSUS BEST AVAILABLE THERAPY IN ANEMIC OR THROMBOCYTOPENIC SUBJECTS WITH PRIMARY MYELOFIBROSIS, POST-POLYCYTHEMIA VERA MYELOFIBROSIS, OR POST-ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA MYELOFIBROSIS WHO WERE TREATED WITH RUXOLITINIB	Cerrado a inclusión en seguimiento	Ensayo de Fase III	2ª Línea o sucesivas