

Instrucciones de recogida de muestras para la medida de **CALPROTECTINA FECAL**

Le vamos a realizar una prueba en heces para medir una sustancia llamada Calprotectina con el objetivo de saber si existe inflamación de la mucosa intestinal.

Material necesario

Se utiliza un tubo de recogida de heces que contiene una solución líquida.



No olvide:

CONSERVAR EN NEVERA antes y después de la recogida de la muestra


Para obtener un resultado válido de la prueba debe seguir el procedimiento de recogida

Procedimiento

1. Colocar una capa de papel higiénico en el váter y sentarse, si es posible, de cara al mismo.




2. Es importante mantener el tubo en posición vertical, **DESENROSCAR** el tapón blanco y extraer el bastoncillo. Evitar derramar el líquido.




NO DESENROSCAR el tapón azul.


3. Introducir, únicamente, la **punta del bastoncillo** dentro de las heces y girar antes de volver a sacarla.
Repetir en 3 ó 5 posiciones diferentes hasta llenar completamente las ranuras del bastoncillo.



4. Introducir el bastoncillo con cuidado dentro del tubo y empujar hacia abajo hasta la posición final de bloqueo (sentirá y oirá dos clicks).



5. Agitar el tubo durante unos segundos.



6. Entregar el tubo en el laboratorio el mismo día de la recogida de la muestra.
Si no es posible, **mantenerlo en nevera** un máximo de 2 días antes de su entrega en el laboratorio.

