



Servicio Medicina Nuclear
Puerta "G" Planta Sótano Ala Norte

GAMMAGRAFIA SUPRARRENAL CON MIBG

PREPARACIÓN: Tomará Yoduro Potásico 130mgr. cápsulas con agua cada 24h, desde tres días antes de la prueba hasta dos días después de finalizar.

SI ALERGIA AL YODO: Cambiar yoduro potásico por PERCLORATO SÓDICO 400mgr. (1,3ml).

**RECOGER LA MEDICACION EN PREPARACION DE PRUEBAS
(Puerta I, planta baja sur).**

EXPLORACIÓN: Consiste en la realización de un estudio suprarrenal para valorar posibles patologías.

TÉCNICA: Se inyecta un radiofármaco por vía intravenosa.
Se realizan imágenes a las 4 h y a las 24h de la inyección.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

No produce dolor.

Si tiene alergias conocidas al Yodo, consulte a su médico.

PRECAUCIONES: Las mujeres en periodo de lactancia deberán advertirlo antes de la inyección. Nosotros le indicaremos si deben interrumpirla y por cuánto tiempo.

Durante las 48h posteriores a la inyección, evitará el contacto con embarazadas y niños menores de 13 años.

CONTRAINDICACIONES:

Embarazo (salvo casos excepcionales). Si cree que puede estar embarazada deberá consultar al especialista, antes de la inyección.

SI TIENE ALGUNA DUDA PREGUNTE AL MÉDICO O A LA ENFERMERA DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS
Horario (lunes a viernes de 8,30h a 17 h. (tef. 91/ 330 3000 ext 7505).