



DETECCIÓN DE GANGLIO CENTINELA EN CÁNCER DE MAMA

La biopsia selectiva del ganglio centinela es el procedimiento de elección para localizar los ganglios axilares que deben ser extirpados en la cirugía de su tumor mamario.

PREPARACIÓN

- No se requiere ningún tipo de preparación especial para la prueba.
- Si lo desea puede venir con una acompañante.

EXPLORACIÓN

- Se inyecta un radiofármaco por vía intradérmica alrededor de la areola mamaria. Deberá esperar entre 30 minutos y dos horas para la adquisición de las imágenes gammagráficas para tratar de localizar el/los ganglio/s centinela.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Puede notar ligera molestia en los puntos de inyección.
- Aconsejamos beber abundante líquido y orinar con frecuencia en las horas posteriores a la realización de la prueba.

PRECAUCIONES

- Las mujeres en periodo de lactancia deberán advertirlo antes de la inyección. El especialista le indicará si debe interrumpirla y por cuánto tiempo.
- Durante 24 horas después la inyección evitará el contacto con embarazadas y niños menores de 13 años.

CONTRAINDICACIONES

Si está **EMBARAZADA** o cree que pudiera estarlo, deberá advertirlo al médico del Servicio de Medicina Nuclear antes de la inyección.

SI TIENE ALGUNA DUDA PREGUNTE A SU MÉDICO DE MEDICINA NUCLEAR