

Servicio Microbiología Clínica
Puerta "I" Planta 1ª Ala Sur

DETECCION DE HELMINTOS EN HECES

Esta prueba se realiza para descartar que usted padezca una infección por parásitos intestinales del tipo Helmintos. Si así fuese, los parásitos se eliminarían por las heces, por eso, este es el modo de detectarlos y poder iniciar el tratamiento.

TIPO DE MUESTRA: HECES

MATERIAL: Envase con cucharilla (contiene liquido conservador)



MODO DE RECOGIDA DE MUESTRA

1. Lávese las manos con agua y jabón.
2. Defeca sobre una superficie, recipiente (palangana. etc....) con cuidado de que no se mezcle con orina ni con sangre de la menstruación.
3. Abra el envase con cuidado. **NO ELIMINAR** el líquido conservador del envase.
La cantidad de heces a introducir en el envase será la que quepa en la cucharilla que va unida a la tapa (**no se debe separar de ésta**).
Tapar y agitar suavemente.
(Si el envase no llevara cucharilla la cantidad será más o menos del tamaño de una almendra, que se puede recoger con una cucharilla limpia).
4. Debido a la expulsión intermitente de parásitos, para esta determinación es conveniente la recogida de **TRES muestras en días consecutivos**, cada una en un **envase distinto**.
5. Las tres muestras recogidas deben guardarse **refrigeradas** (nevera) hasta entregarlas en el laboratorio de Microbiología lo antes posible.
6. Lávese de nuevo las manos con agua y jabón.

NUNCA LLENAR EL ENVASE. SE RECHAZARÁ LA MUESTRA