

Observaciones

Este tratamiento no presenta complicaciones mayores y no han sido descritas contraindicaciones absolutas a su administración.

Por lo general es bien tolerado y causa pocas reacciones adversas, si es que las produce. Ocasionalmente, los pacientes pueden experimentar reacciones locales (irritación, ardor) como resultado de la procedimiento de instilación.

Si el paciente presenta infección de orina en alguna de las sesiones es conveniente suspender esa sesión, y dejarlo para la semana siguiente.

Esta prueba se puede realizar en Consultas Baja sur (Sala B030) ó en la Unidad de Diagnóstico Urológico 3ª Norte (Sala 3005). Para cualquier duda, consulta o anulación de cita contacte con nosotros.

Unidad de Diagnóstico Urológico
TERCERA NORTE
SALA 3005

 **91 7043642**

CONSULTAS
BAJA SUR
SALA B030

 **91 7043878**

Instilación Vesical con Ácido Hialurónico



Hospital Clínico San Carlos

C/ Profesor Martín Lagos s/n

28040 Madrid

Tfno 91 330 3000

www.comunidad.madrid/hospital/clinicosancarlos

Documento Informativo
para pacientes y familiares
Servicio de Urología
Hospital Clínico San Carlos

¿Qué es una instilación vesical?

La instilación vesical es un procedimiento mediante el cual se administra medicación en la vejiga a través de una sonda de pequeño calibre que se retirará inmediatamente después.

Es un tratamiento que se realiza de forma ambulatoria, sin dolor, no requiere ninguna preparación,

Suele precisar de 12 sesiones. Las 4-6 primeras de forma semanal y posteriormente quincenal-mensual..

¿Para que se administra el ácido hialurónico?

La instilación de **ácido hialurónico** contribuye a la recuperación de la mucosa urotelial (capa más superficial de la vejiga, en contacto con la orina).

Está indicado en casos de vejiga dolorosa, cistitis intersticial, cistitis química, infecciones urinarias de repetición o cistopatía rádica.

En el hospital tenemos 3 productos con diferentes concentraciones de ácido hialurónico. El urólogo determinará cual le administrará en su caso.

Procedimiento

Cuando el paciente no tiene una sonda, se le coloca una sonda uretral por la que, una vez que la vejiga esté vacía, se le administrará el fármaco.

Es recomendable retenerlo en la vejiga dos horas (se recomienda como mínimo 30 minutos).

No se precisan cambios posturales,

Posteriormente, el fármaco será eliminado con la orina.



CALENDARIO DE INSTILACIONES

Medicamento _____

		FECHA	HORA	FIRMA
1 ^a	SEMANAL			
2 ^a				
3 ^a				
4 ^a				
5 ^a				
6 ^a				
7 ^a	QUINCENAL			
8 ^a				
9 ^a	MENSUAL			
10 ^a				
11 ^a				
12 ^a				
13 ^a				
14 ^a				
15 ^a				