

INSTRUCCIONES. INYECCIÓN INTRAVITREA

Existen varias medicaciones indicadas para diferentes enfermedades de los ojos que deben inyectarse en el globo ocular. La inyección se realiza en un espacio estéril para reducir el riesgo de infecciones.

Para que el proceso transcurra en las mejores condiciones, contamos con su colaboración. Por favor lea atentamente las siguientes instrucciones.

ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- No precisa preparación especial

EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO

- Desayune a su hora habitual.
- Tome su medicación habitual.
- Realizará una **higiene** adecuada (ducha corporal), vendrá sin maquillar y con las uñas sin pintar.
- Acuda al hospital acompañado de un adulto responsable, teniendo en cuenta que es posible que tenga borrosidad de la visión posterior a la prueba o que esté mareado.
- Tenga en cuenta que la hora asignada es aproximada, ya que depende de incidencias en cirugías o técnica diagnósticas previas, etc.
- Acudirá al hospital en un **medio de transporte** (el paciente no podrá conducir después de la operación). Venga **acompañado**.
- Al llegar al hospital deberá **registrarse** en el kiosco de información, a no ser que se le indicara algo distinto en la llamada de aviso. Después deberá acudir a la primera planta (area de CMA)
- Para pasar a quirófano se le proporcionará una bata para colocarse encima de su ropa. Es preferible que venga vestido con una **camisa** que se pueda abrir por delante. **No traiga joyas ni objetos metálicos**
- A la salida, el médico le facilitará su **informe** y las **recomendaciones** sobre curas, cuidados y revisiones.

DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO

- Con relativa frecuencia, en los primeros días pueden aparecer ciertos síntomas oculares como lagrimeo, picor, escozor, sensación de cuerpo extraño o incluso dolor. Se trata de síntomas propios de la cicatrización, normalmente pasajeros y que ceden espontáneamente
- No podrá presionar, ni frotar el ojo operado, ni apoyarse sobre él al tumbarse
- Evitará sumergirse en el mar o piscina

-
- Debe llevar una vida tranquila, y puede realizar su higiene personal habitual.
 - El médico le indicará la medicación que deberá aplicarse en los días posteriores
 - **Síntomas de alarma que requieren contactar con su oftalmólogo:**
 - Disminución marcada de la visión
 - Dolor ocular a la luz
 - Aumento del enrojecimiento ocular
 - Secreción purulenta del ojo
 - **Síntomas de alarma que requieren ser valorados por su médico internista o servicio de urgencias:**
 - Dolor abdominal con vómitos y estreñimiento
 - Sangrado anormal
 - Dolor en el pecho
 - Dificultad al hablar
 - Dolor de cabeza importante
 - Debilidad de alguna extremidad

Advertencias.