



## FÁRMACOS ANTICOLVULSIVANTES USADOS EN EL DOLOR NEUROPÁTICO ONCOLÓGICO

---

En el tratamiento del dolor neuropático oncológico, este tipo de fármacos no son recetados para tratar las convulsiones, sino el dolor.

Se pueden tardar varias semanas en notar los efectos.

Para reducir el riesgo de padecer efectos secundarios, el médico puede comenzar por recetarte una dosis baja de estos medicamentos e incrementarla progresivamente.

Si observa cambios en sus patrones de pensamiento o estado de ánimo, mientras tome estos medicamentos, hable con tu médico de inmediato.

Les recordamos que los fármacos deben ser administrados **EXCLUSIVAMENTE bajo receta médica**.

Su médico o enfermera le informará de todo lo que necesita saber sobre el fármaco.

Los más prescritos son la Gabapentina, la Pregabalina y la Oxcarbazepina.

### GABAPENTINA

Otros nombres: Gabatur<sup>®</sup>, Neurontin<sup>®</sup>

Puede tardar varias semanas en notar los efectos.

Sus principales efectos secundarios son: sedación, mareo, ganancia de peso, edema o visión borrosa.

### PREGABALINA

Otros nombres: Lyrica<sup>®</sup>, Gatica<sup>®</sup>, Aciryl<sup>®</sup>, Frida<sup>®</sup>, Pramep<sup>®</sup>, Premax<sup>®</sup>

Puede tardar varias semanas en notar los efectos.



# InnovaHONCO

Hospital Universitario de Fuenlabrada

Sus principales efectos secundarios son: sedación, mareo, ganancia de peso, edema y visión borrosa.

## **OXCARBAZEPINA**

Otros nombres: Trileptal®

Puede tardar varias semanas en notar los efectos.

Los principales efectos secundarios de este medicamento son: temblor, problemas de coordinación, movimientos involuntarios de los ojos, sensación de nerviosismo, sensación de depresión, cambios de humor y erupción cutánea.

**Recuerde que los fármacos deben ser administrados exclusivamente BAJO RECETA MÉDICA.**

**Su médico o enfermera le informará de todo lo que necesita saber sobre el fármaco.**