



TRATAMIENTOS TÓPICOS USADOS EN EL DOLOR NEUROPÁTICO ONCOLÓGICO

La **terapia tópica** es aquella que permite que el principio activo se aplique directamente sobre el órgano diana, la piel, con el fin de lograr alivio o curación.

Estos tratamientos tienen pocos efectos secundarios o interacciones con otros fármacos.

Les recordamos que los fármacos deben ser administrados **EXCLUSIVAMENTE bajo receta médica**.

Su médico o enfermera le informará de todo lo que necesita saber sobre el fármaco.

Los más prescritos son los parches de Lidocaina 5% y de Capsaicina 8%.

LIDOCAÍNA 5%

Nombre comercial: parche de Versatis® (difícil prescribirlo salvo para la Neuralgia postherpética).

Efecto secundario: enrojecimiento de la piel que cubre.

CAPSAICINA 8%

Nombre comercial: parche de Qutenza®.

Efectos secundarios: quemazón, dolor, eritema y prurito locales y transitorios en la zona de aplicación. No son graves, pero pueden llegar a ser muy molestos por lo que precisa ingreso en el Hospital de Día durante unas horas.

También existe la crema de capsaicina al 0,075% para uso domiciliario.

Recuerde que los fármacos deben ser administrados exclusivamente BAJO RECETA MÉDICA.

Su médico o enfermera le informará de todo lo que necesita saber sobre el fármaco.