

CABOZANTINIB (Cabometyx®)



¿Qué es CABOZANTINIB y para qué se utiliza?

Es un antineoplásico, pertenece a un grupo de fármacos conocidos como inhibidores de la tirosin kinasa (ITK). Impide el crecimiento de células tumorales y la progresión metastásica, utilizado en el tratamiento del carcinoma de células renales.

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a Cabozantinib o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad hepática, renal, enfermedad inflamatoria intestinal, acontecimientos tromboembólicos, sangrados previos o enfermedad cardíaca.



Excipientes: Lactosa

¿Cómo debe tomar CABOZANTINIB?

Medicamento	Pauta	Cómo administrarlo
CABOZANTINIB (Cabometyx)	1 comprimido (60mg) una vez al día	<ul style="list-style-type: none"> • Se toma una vez al día, siempre a la misma hora. • Deberá tomar la dosis indicada sin alimentos (No ingiera ningún alimento 2 horas antes o 1 hora después de tomar la medicación). • Tómelo con un vaso de agua. No fraccione ni mastique los comprimidos.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si quedan MÁS de 12 horas para la próxima dosis: Tome la dosis olvidada, y continúe su tratamiento con normalidad.

Si quedan MENOS de 12 horas para la próxima dosis: NO tome la dosis olvidada, y continúe su tratamiento con normalidad.

En caso de vómito, **NO** tome otra dosis ese día, y continúe su tratamiento con normalidad.



¿Cómo conservar CABOZANTINIB?

A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.





¿Qué efectos adversos puede tener?

La reacción que cada persona tiene a su tratamiento es única. Hay personas que tienen pocos efectos adversos, mientras que hay otras que tienen más. A continuación, se exponen los más comunes, a fin de que sea consciente de ellos y sepa detectarlos si ocurre alguno. Si nota alguna reacción que crea que puede deberse a la medicación, pero que no está incluida en este folleto, deberá hacérselo saber a su médico y/o farmacéutico.

Alteraciones gastrointestinales → Diarrea es frecuente, beba abundante líquido. Náuseas, vómitos
Dolor abdominal, estreñimiento
Alteración del sabor de los alimentos. Reflujo gastroesofágico

Estomatitis → Dolor/inflamación de la mucosa oral. Mantener buena higiene de la cavidad oral, suele desaparecer tras 2-4 semanas de tratamiento.

Hipertensión, edemas, retención de líquidos en miembros inferiores

Cansancio, fatiga

Alteraciones dérmicas → Síndrome mano-pie. Enrojecimiento e inflamación en palmas de manos y en plantas de pies. Cambios en la sensibilidad como hormigueo o entumecimiento.

Avisé a su médico y/o farmacéutico si presenta:

- Si presenta más de 4-6 deposiciones diarreicas al día o si continua con ellas tras iniciar tratamiento
- Dolor de cabeza, aumentos de la tensión arterial, mareos o dolor torácico
- Dificultad para respirar
- Sangrados o si va a someterse a alguna intervención quirúrgica



¿CABOZANTINIB puede interactuar con otros fármacos?

Algunos medicamentos pueden interactuar con CABOZANTINIB. Informe a su médico y farmacéutico de cualquier medicación que vaya a empezar a tomar o esté tomando, incluyendo medicamentos que se adquieren sin receta, tales como suplementos o plantas medicinales y derivados. Algunos fármacos que pueden interactuar son: Antibióticos, antifúngicos, antiepilépticos...

ADVERTENCIAS



Embarazo y lactancia

- ❖ CONTRAINDICADO en mujeres embarazadas o que puedan estarlo y en la lactancia.
- ❖ Se recomienda utilizar medidas contraceptivas eficaces tanto en hombres como en mujeres durante y después de finalizar el tratamiento (al menos 4 meses), ya que puede provocar daños en el desarrollo fetal.



Conducción

- ❖ En caso de sentirse mareado, cansado.



Otras advertencias de interés:

- ❖ En caso de finalizar el tratamiento, devuelva al Servicio de Farmacia la medicación sobrante, no los deseche en la basura de su domicilio.
- ❖ No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que se indica en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Consulta de Atención Farmacéutica Oncológica-Hematológica

Horario: 08:00 a 22:00 h

Teléfono: 91-6839360

Cambio de cita: 2623/6348

Resolución de dudas: 2843/2023

Horario de la consulta:

- Lunes a viernes de 10:00 a 14:30 h

Para CAMBIOS DE CITA o
RESOLUCIÓN DE DUDAS escanee este
código QR



Para consultar otra información de
nuestra Página Web escanee este
Código QR

