Hospital Universitario de Getafe

Comunidad de Madrid

CAPECITABINA



¿Qué es CAPECITABINA y para qué se utiliza?

Es un antineoplásico (análogo de 5-fluoruracilo), que impide el crecimiento y división de las células cancerosas. Se utiliza en el tratamiento del cáncer de colon, recto, gástrico y mama, entre otros.

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a Capecitabina o alguno de sus excipientes.
- Historial de diabetes o enfermedad del riñón, hígado o corazón.

Excipientes: Lactosa

¿Cómo debe tomar CAPECITABINA?

Dosis de capecitabina: Se calcula específicamente para cada paciente en función del diagnóstico y de su superficie corporal, por lo que su médico y farmacéutico le informarán de la dosis adecuada para usted.

Pauta:

- Durante 14 días o 21 días seguidos de un periodo de descanso de 7 días. Este periodo de 21 días o 28 días es un ciclo de tratamiento.
- También puede administrarse de manera continua, sin periodo de descanso (Junto con radioterapia)

Medicamento	Pauta	Cómo administrarlo
CAPECITABINA	Dosis indicada para usted	• Se toma dos veces al día, siempre a la misma hora cada 12 horas • Los comprimidos se deben ingerir con agua **dentro de los 30 minutos siguientes a una comida (con el estómago lleno.)** • Tómelo con un vaso de agua.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si quedan MÁS de 6 horas para la próxima dosis: Tome la dosis olvidada, y continúe su tratamiento con normalidad.

Si quedan MENOS de 6horas para la próxima dosis: NO tome la dosis olvidada, y continúe su tratamiento con normalidad.

En caso de vómito, **NO** tome otra dosis ese día, y continúe su tratamiento con normali

¿Cómo conservar CAPECITABINA?

A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.

Debe conservar los comprimidos en el envase original.

Consulta de Atención Farmacéutica Oncológica-Hematológica
Teléfonos de contacto: 91-6839360 ext. 2843/2023

¿Qué efectos adversos puede tener?

La reacción que cada persona tiene a su tratamiento es única. Hay personas que tienen pocos efectos adversos, mientras que hay otras que tienen más. A continuación, se exponen los más comunes, a fin de que sea consciente de ellos y sepa detectarlos si ocurre alguno. Si nota alguna reacción que crea que puede deberse a la medicación, pero que no está incluida en este folleto, deberá hacérselo saber a su médico y/o farmacéutico.

Alteraciones gastrointestinales → Se médico le indicará medicamentos en caso de diarrea o vómitos
Dolor abdominal, estreñimiento → Beber abundante agua
Alteración del sabor de los alimentos → Buena higiene bucal

Alteraciones dérmicas → Síndrome mano-pie. Enrojecimiento, inflamación, oscurecimiento en palmas de manos y en plantas de pies. Cambios en la sensibilidad como hormigueo/entumecimiento.

Hipertensión, edemas, retención de líquidos en miembros inferiores

Cansancio, fatiga, debilidad

Avise a su médico y/o farmacéutico si presenta:

- Si presenta mas de 4-6 deposiciones diarreicas al día o si continua con ellas tras iniciar tratamiento
- Fiebre (Tª>38ºC)
- Hemorragias, moratones sin razón aparente
- Se siente mal repentinamente

¿CAPECITABINA puede interaccionar con otros fármacos?

Algunos medicamentos pueden interaccionar con CAPECITABINA. Informe a su médico y farmacéutico de cualquier medicación que vaya a empezar a tomar o esté tomando, incluyendo medicamentos que se adquieren sin receta, tales como suplementos o plantas medicinales y derivados.
Algunos fármacos que pueden interaccionar son: Alopurinol, acenocumarol, fenitoina.
Avise en caso de tomar ácido fólico ya que puede aumentar los efectos secundarios de la capecitabina.

ADVERTENCIAS

Embarazo y lactancia

- CONTRAINDICADO en mujeres embarazadas o que puedan estarlo y en la lactancia (Dado que el potencial daño para el lactante es desconocido, la lactancia debe ser interrumpida mientras se recibe tratamiento con capecitabina y hasta 2 semanas después de la dosis final)
- Se recomienda utilizar medidas contraceptivas eficaces tanto en hombres como en mujeres durante y después de finalizar el tratamiento (al menos unos meses), ya que puede provocar daños en el desarrollo fetal.

Conducción

- En caso de sentirse mareado, cansado.

Otras advertencias de interés:

- En caso de finalizar el tratamiento, devuelva al Servicio de Farmacia la medicación sobrante, no los deseche en la basura de su domicilio.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que se indica en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Consulta de Atención Farmacéutica Oncológica-Hematológica
Horario: 08:00 a 22:00 h
Teléfono: 91-6839360
Cambio de cita: 2623/6348
Resolución de dudas: 2843/2023

Para **CAMBIOS DE CITA** o **RESOLUCIÓN DE DUDAS** escanee este código QR

Para consultar otra información de nuestra **Página Web** escanee este Código QR

Horario de la consulta:

- Lunes a viernes de 10:00 a 14:30 h