

DASATINIB (Sprycel®)



¿Qué es DASATINIB y para qué se utiliza?

Es un antineoplásico, pertenece a un grupo de fármacos conocidos como inhibidores de la tirosin quinasa BCR ABL. Impide el crecimiento de células tumorales que expresan esta proteína, utilizado en el tratamiento de la Leucemia Mieloide Crónica y Leucemia Linfóide Aguda.

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a Dasatinib o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad del hígado o cardiopulmonar.

Excipientes: Lactosa



¿Cómo debe tomar DASATINIB?

Medicamento	Patología	Pauta
DASATINIB (Sprycel)	Leucemia Mieloide Crónica en fase crónica	100 mg (2 cápsulas de 50 mg) una vez al día
	Leucemia Mieloide Crónica en otras fases (acelerada o crisis blástica) o Leucemia Linfóide Aguda	140 mg (2 cápsulas de 70 mg) una vez al día

Cómo administrarlo

- Los comprimidos se deben ingerir con agua **con o sin alimentos** (una vez al día, respete siempre la misma hora de administración)
- En caso de molestias gastrointestinales, se recomienda administrarlo con comida
- No fraccione ni mastique los comprimidos

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si quedan MÁS de 12 horas para la próxima dosis: Tome la dosis olvidada, y continúe su tratamiento con normalidad.

Si quedan MENOS de 12 horas para la próxima dosis: NO tome la dosis olvidada, y continúe su tratamiento con normalidad.

En caso de vómito, **NO** tome otra dosis ese día, y continúe su tratamiento con normalidad.

¿Cómo conservar DASATINIB?

A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.





¿Qué efectos adversos puede tener?

La reacción que cada persona tiene a su tratamiento es única. Hay personas que tienen pocos efectos adversos, mientras que hay otras que tienen más. A continuación, se exponen los más comunes, a fin de que sea consciente de ellos y sepa detectarlos si ocurre alguno. Si nota alguna reacción que crea que puede deberse a la medicación, pero que no está incluida en este folleto, deberá hacérselo saber a su médico y/o farmacéutico.

Dolor de cabeza, cansancio, mareos

Alteraciones gastrointestinales → diarrea, náuseas, vómitos, dolor estomacal

Inflamación de la mucosa oral, aparición de llagas

Moratonos o sangrados → Por la disminución de plaquetas en sangre, se controla con las analíticas periódicas

Rash cutáneo, acné, caída de cabello, sequedad de la piel

Alteraciones visuales → Sequedad ocular, visión borrosa

Aumento de peso por retención de líquidos, hinchazón en los tobillos → Su médico podría indicarle la toma de diuréticos para favorecer la eliminación

Avisé a su médico y/o farmacéutico si presenta:

- Si presenta signos inusuales de sangrado: dolor de cabeza, mareo o debilidad, tos o vómitos con sangre, heces de color rojo o muy negro
- Tª mayor o iguala 38°C
- Si nota palpitaciones, mareos, cansancio, sensación de aturdimiento, piernas hinchadas o falta de aire



¿DASATINIB puede interactuar con otros fármacos?

Algunos medicamentos pueden interactuar con DASATINIB. Informe a su médico y farmacéutico de cualquier medicación que vaya a empezar a tomar o esté tomando, incluyendo medicamentos que se adquieren sin receta, tales como suplementos o plantas medicinales y derivados.

Protectores gástricos / antiácidos: En caso de tener que tomarlo, espaciar 2 horas antes y después de tomar DASATINIB.

ADVERTENCIAS



Embarazo y lactancia

- ❖ CONTRAINDICADO en mujeres embarazadas o que puedan estarlo y en la lactancia.
- ❖ Se recomienda utilizar medidas contraceptivas eficaces tanto en hombres como en mujeres durante el tratamiento, ya que puede provocar daños en el desarrollo fetal.

Conducción



- ❖ Si experimentan trastornos visuales o algún otro efecto adverso (mareo, cansancio) que pueda afectar a su capacidad para conducir.

Otras advertencias de interés:



- ❖ En caso de finalizar el tratamiento, devuelva al Servicio de Farmacia la medicación sobrante, no los deseche en la basura de su domicilio.
- ❖ No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que se indica en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Consulta de Atención Farmacéutica Oncológica-Hematológica

Horario: 08:00 a 22:00 h

Teléfono: 91-6839360

Cambio de cita: 2623/6348

Resolución de dudas: 2843/2023

Horario de la consulta:

- Lunes a viernes de 10:00 a 14:30 h

Para CAMBIOS DE CITA o RESOLUCIÓN DE DUDAS escanee este código QR



Para consultar otra información de nuestra Página Web escanee este Código QR

