

## ELTROMBOPAG (Revolade®)



### ¿Qué es ELTROMBOPAG y para qué se utiliza?

Es un factor estimulante de colonias que actúa en la médula ósea promoviendo la creación de plaquetas. Está indicado en el tratamiento de trombocitopenia y anemia aplásica grave.

### ¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a ELTROMBOPAG o alguno de sus excipientes
- Historial de enfermedad hepática, cardíaca, riesgo o antecedentes de sufrir trombos.

**Excipientes:** Manitol, carboximetilalmidón



### ¿Cómo debe tomar ELTROMBOPAG?

Medicamento	Pauta	Cómo administrarlo
ELTROMBOPAG (Revolade)	<p><b>DOSIS INICIAL:</b> 50 mg (1 comprimido), una vez al día</p> <p>Se podrán realizar modificaciones en función del recuento de plaquetas y tolerancia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se toma una vez al día, siempre a la misma hora</li> <li>• Deberá tomar la dosis indicada <b>sin alimentos</b> (1 hora antes o dos horas después de las comidas)</li> <li>• Tómelo con un vaso de agua. No fraccione ni mastique los comprimidos</li> <li>• Al menos 4 horas antes o después de antiácidos, productos lácteos o suplementos vitamínicos y minerales que contengan hierro, magnesio, calcio, aluminio, selenio o zinc.</li> </ul>

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24



### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

**Si quedan MÁS de 12 horas para la próxima dosis:** Tome la dosis olvidada, y continúe su tratamiento con normalidad.

**Si quedan MENOS de 12 horas para la próxima dosis:** NO tome la dosis olvidada, y continúe su tratamiento con normalidad.

En caso de vómito, tome otra dosis si han pasado **menos de 30 minutos** desde que ha tomado el medicamento.



### ¿Cómo conservar ELTROMBOPAG?

A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.





### ¿Qué efectos adversos puede tener?

La reacción que cada persona tiene a su tratamiento es única. Hay personas que tienen pocos efectos adversos, mientras que hay otras que tienen más. A continuación, se exponen los más comunes, a fin de que sea consciente de ellos y sepa detectarlos. Si sufre alguno de ellos, puede solicitarnos consejo. Si nota alguna reacción que crea que puede deberse a la medicación, pero que no está incluida en este folleto, deberá hacérselo saber a su médico y/o farmacéutico.

Infecciones del tracto respiratorio superior (nasofaringitis, rinitis), tos

Alteración gastrointestinal: náuseas, diarrea, dolor abdominal

Alteración ocular: visión borrosa menos clara, formación de cataratas, sequedad de ojos, picor.

Trastorno del sueño, sofocos, vértigo, dolor muscular

Dolor e inflamación en la mucosa oral. Pequeñas úlceras en la boca. Mantener buena higiene bucal

### Avisé a su médico y/o farmacéutico si presenta:

- Tª por encima de 38°C, si de repente se siente mal o si tiene síntomas de infección.
- Si interrumpe el tratamiento, puede haber riesgo de sangrado/hemorragia.
- Si experimenta hinchazón, dolor, calor, enrojecimiento o sensibilidad en una pierna, dificultad respiratoria, dolor de pecho, tos con sangre. Por mayor riesgo de trombos.
- Si presenta color amarillento de piel u ojos o si su orina tiene un color oscuro anormal.



### ¿ELTROMBOPAG puede interactuar con otros fármacos?

Algunos medicamentos pueden interactuar con ELTROMBOPAG. Informe a su médico y farmacéutico de hospital de cualquier medicación que vaya a empezar a tomar o esté tomando, incluyendo medicamentos que se adquieren sin receta, tales como suplementos o plantas medicinales y derivados.

## ADVERTENCIAS

### Embarazo y lactancia.



- ❖ **CONTRAINDICADO** en mujeres embarazadas o que puedan estarlo y en la lactancia (esperar un mes tras finalizar tratamiento para dar la lactancia).
- ❖ Tanto hombres como mujeres en edad fértil, deben usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento.
- ❖ Fertilidad: Puede afectar a la capacidad de una mujer para quedarse embarazada. Hable con su médico si esto le preocupa. No hay ningún efecto en los varones.

### Conducción



- ❖ Si experimentan algún efecto adverso (mareo, cansancio) que pueda afectar a su capacidad para conducir.

### Otras advertencias de interés:



- ❖ En caso de finalizar el tratamiento, devuelva al Servicio de Farmacia la medicación sobrante, no los deseche en la basura de su domicilio.
- ❖ No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que se indica en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

### Consulta de Atención Farmacéutica Oncológica-Hematológica

Horario: 08:00 a 22:00 h

Teléfono: 91-6839360

Cambio de cita: 2623/6348

Resolución de dudas: 2843/2023

### Horario de la consulta:

- Lunes a viernes de 10:00 a 14:30 h

Para CAMBIOS DE CITA o RESOLUCIÓN DE DUDAS escanee este código QR



Para consultar otra información de nuestra Página Web escanee este Código QR

