

## OSIMERTINIB



### ¿Qué es OSIMERTINIB y para qué se utiliza?

Pertenece al grupo de inhibidores de las proteínquinasas. Actúa directamente sobre las células tumorales deteniendo su crecimiento o destruyéndolas. Se utiliza en el tratamiento de adultos con cáncer de pulmón no microcítico localmente avanzado o metastásico con mutación EGFR positiva.

#### ¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Si sufre problemas pulmonares, de hígado, riñón y/o corazón.
- Si está en tratamiento con fármacos que afecten a la coagulación de la sangre.
- Si piensa someterse a una intervención/cirugía, o si lo ha hecho recientemente.
- Embarazo y lactancia.

**Excipientes:** Sodio



### ¿Cómo debe tomar OSIMERTINIB?

El tratamiento con Osimertinib se debe iniciar y supervisar por un médico con experiencia en terapias antineoplásicas.

#### **Pauta:**

- **Dosis de capecitabina:** La dosis recomendada es de 80 mg una vez al día.
- Es posible que su médico tenga que ajustar su dosis en función de cómo responda al tratamiento.

Medicamento	Pauta	Cómo administrarlo
OSIMERTINIB	Dosis indicada para usted	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tome los comprimidos por vía oral, con un vaso de agua, a la misma hora todos los días. Puede tomarlo con o sin alimentos.</li> <li>• <b>Trague los comprimidos enteros.</b> No los parta, rompa, ni mastique.</li> </ul>

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24



### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

**Si se olvida una dosis:** Tómela en caso de que queden más de 12 horas para la próxima dosis y continúe su tratamiento con normalidad. En caso contrario, omita la dosis.

En caso de vómito, **NO** tome una dosis extra sin que se lo indique su médico.



### ¿Cómo conservar OSIMERTINIB?

A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.





## ¿Qué efectos adversos puede tener?

La reacción que cada persona tiene a su tratamiento es única. A continuación, se exponen los más comunes, a fin de que sea consciente de ellos y sepa detectarlos si ocurre alguno. Si nota alguna reacción que crea que puede deberse a la medicación, pero que no está incluida en este folleto, **deberá hacérselo saber a su médico y/o farmacéutico.**

Reacciones adversas muy frecuentes:

- Diarrea
- Dolor e inflamación de la mucosa oral (“estomatitis”)
- Alteraciones en la piel y/o uñas
- Reducción temporal del funcionamiento de la médula ósea: se observa en las analíticas realizadas por su médico.

Reacciones adversas frecuentes:

- Inflamación de los pulmones: repentina dificultad al respirar, tos y fiebre.

Otros:

- Alteración en el funcionamiento del corazón.

### **Avisé a su médico y/o farmacéutico si presenta:**

- Dificultad para respirar
- Erupción cutánea y/o picor
- Hinchazón de cara, labios, lengua, garganta



## ¿OSIMERTINIB puede interactuar con otros fármacos?

Algunos medicamentos pueden interactuar con OSIMERTINIB. Informe a su médico y farmacéutico de cualquier medicación que vaya a empezar a tomar o esté tomando, incluyendo medicamentos que se adquieren sin receta, tales como suplementos o plantas medicinales y derivados.

- Algunos antibióticos (Rifampicina) y antiepilépticos (Fenitoína, Carbamazepina o Fenobarbital).
- Hierba de San Juan.
- Otros: Rosuvastatina (para el colesterol), píldora anticonceptiva hormonal oral, Bosentan (para la presión arterial pulmonar), Efavirenz y Etravirine (para el VIH/SIDA), Modafinilo (trastornos del sueño), Dabigatrán (prevención de coágulos), Digoxina (para anomalías cardíacas) y Aliskireno (para la tensión arterial alta).

## ADVERTENCIAS

### Embarazo y lactancia



- ❖ Si está embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte con su médico antes de tomar el medicamento. Ambos decidirán la continuidad del tratamiento.
- ❖ No se debe quedar embarazada durante el tratamiento con Osimertinib.
- ❖ Debe utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento tanto si es mujer como hombre, puesto que Osimertinib puede pasar al semen humano.

### Conducción



- ❖ No afecta o no afecta de forma significativa sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas.

### Otras advertencias de interés:



- ❖ En caso de finalizar el tratamiento, devuelva al Servicio de Farmacia la medicación sobrante, no los deseche en la basura de su domicilio.
- ❖ No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que se indica en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

## Consulta de Atención Farmacéutica Oncológica-Hematológica

Horario: 08:00 a 22:00 h

Teléfono: 91-6839360

Cambio de cita: 2623/6348

Resolución de dudas: 2843/2023

### Horario de la consulta:

- Lunes a viernes de 10:00 a 14:30 h

Para CAMBIOS DE CITA o  
RESOLUCIÓN DE DUDAS escanee este  
código QR



Para consultar otra información de  
nuestra Página Web escanee este  
Código QR

