



PONATINIB 45 mg comprimidos (Iclusig®)



¿Qué es PONATINIB y para qué se utiliza?

Es un inhibidor de tirosina quinasa, que impide el crecimiento de células tumorales, utilizado en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica o linfoblástica aguda.

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a PONATINIB o alguno de sus excipientes
- Historial de enfermedad renal, hepática, cardíaca, hepatitis B y/o tromboembolismo.

Excipientes: Lactosa



¿Cómo debe tomar PONATINIB?

Medicamento	Pauta	Cómo administrarlo
PONATINIB (Iclusig)	45 mg (1 comprimido) un vez al día	<ul style="list-style-type: none"> • Se toma una vez al día, siempre a la misma hora • Deberá tomar la dosis indicada con o sin alimentos • Tómelo con un vaso de agua. No fraccione ni mastique los comprimidos

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

NO tome la dosis olvidada, y continúe su tratamiento con normalidad. En caso de vómito, **NO** tome otra dosis ese día, y continúe su tratamiento con normalidad.

NO duplique dosis en caso de olvidar su toma.



¿Cómo conservar PONATINIB?

A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz.

Debe conservar los comprimidos en el envase original, contiene un desecante NO APTO para su consumo





¿Qué efectos adversos puede tener?

La reacción que cada persona tiene a su tratamiento es única. Hay personas que tienen pocos efectos adversos, mientras que hay otras que tienen más. A continuación, se exponen los más comunes, a fin de que sea consciente de ellos y sepa detectarlos. Si sufre alguno de ellos, puede solicitarnos consejo. Si nota alguna reacción que crea que puede deberse a la medicación, pero que no está incluida en este folleto, deberá hacérselo saber a su médico y/o farmacéutico.

Molestias gastrointestinales: diarrea, estreñimiento, náuseas, vómitos, dolor abdominal o falta de apetito.	Beber abundantes líquidos. Avise en caso de 4-6 deposiciones diarreicas
Aumento de infecciones	Infección urinaria. Avise si nota picor y/o dolor al orinar o micciones más frecuentes.
Disnea	
Aumento de la tensión arterial	Controle su tensión
Reacciones dérmicas	Alteraciones en la piel, picor, erupción. Utilice cremas hidratantes y con factor de protección.
Cansancio, insomnio, dolor de cabeza o dolor óseo o muscular	



¿PONATINIB puede interactuar con otros fármacos?

Algunos medicamentos pueden interactuar con PONATINIB. Informe a su médico y farmacéutico de cualquier medicación que vaya a empezar a tomar o esté tomando, incluyendo medicamentos que se adquieren sin receta, tales como suplementos o plantas medicinales y derivados.

ADVERTENCIAS



Embarazo y lactancia.

- ❖ **CONTRAINDICADO** en mujeres embarazadas o que puedan estarlo y en la lactancia.
- ❖ Tanto hombres como mujeres en edad fértil, deben usar un método anticonceptivo eficaz (**preservativo**) durante el tratamiento.



Conducción

- ❖ La influencia de PONATINIB sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña.



Otras advertencias de interés:

- ❖ En caso de finalizar el tratamiento, devuelva al Servicio de Farmacia la medicación sobrante, no los deseche en la basura de su domicilio.
- ❖ No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que se indica en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Consulta de Atención Farmacéutica Oncológica-Hematológica

Horario: 08:00 a 22:00 h

Teléfono: 91-6839360

Cambio de cita: 2623/6348

Resolución de dudas: 2843/2023

Horario de la consulta:

- Lunes a viernes de 10:00 a 14:30 h

Para CAMBIOS DE CITA o RESOLUCIÓN DE DUDAS escanee este código QR



Para consultar otra información de nuestra Página Web escanee este Código QR

