



IKERVIS 1 MG/ML COLIRIO CICLOSPORINA

¿Qué es y para qué se utiliza?

Es un inmunomodulador/inmunosupresor oftálmico, que bloquea determinadas sustancias inflamatorias y aumenta otras con propiedades antiinflamatorias.

Se utiliza en el tratamiento de la queratitis grave en pacientes adultos que no han respondido a tratamiento con lágrimas artificiales.

¿Cómo se toma?

Medicamento	Pauta	Cómo tomarlo
<i>Ikervis (ciclosporina)</i>	<i>1 gota/día en ojo afectado</i>	<i>Antes de dormir</i>

Es muy importante que **no deje de administrarse su tratamiento y recuerde hacerlo siempre en el mismo momento del día.**

Si se utiliza más de un medicamento oftalmológico tópico, las aplicaciones se deben espaciar al menos **quince minutos**

Su tratamiento se reevaluará cada 6 meses aproximadamente.

Modo de empleo

- Lavar las manos y agitar suavemente antes de la administración.
- Las lentes de contacto se deben quitar antes de la administración y no volverlas a poner hasta la mañana siguiente.
- Tras la administración, cierre los ojos durante **dos minutos**.



¿Y si se me olvida alguna administración?

- ❖ Es importante que no olvide aplicar ninguna dosis, pero si ha olvidado, debe continuar con el tratamiento normal al día siguiente.
- ❖ **Nunca duplique la dosis para compensar un olvido.**



¿Cómo conservarlo?

Conserve dentro de las bolsas de aluminio, el resto de envases unidos. a

CONTRAINDICACIONES



- ❖ Alergia a alguno de los componentes.
- ❖ Si tiene una infección ocular activa.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Es probable que no todos o ninguno de los siguientes efectos adversos aparezcan durante el tratamiento. Avise a su médico si nota cualquiera de estos síntomas u cualquier otro no mencionado aquí:

- ❖ Dolor ocular en el lugar de la instilación.
- ❖ Irritación, eritema y lagrimeo
- ❖ Visión borrosa transitoria
- ❖ Queratitis, herpes
- ❖ Sensación de "cuerpo extraño" (sensación de tener algo dentro del ojo)



ADVERTENCIAS

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de:



Tomar otros medicamentos e IKERVIS

La **ciclosporina** puede interactuar con otros medicamento, haciendo que no funcionen correctamente o que empeoren sus posibles efectos adversos, como:

- ❖ **Beta-bloqueantes**
- ❖ **Corticoides de uso oftálmico**



Embarazo y lactancia

- ❖ No debe utilizarse durante el embarazo, a menos que sea claramente necesario.
- ❖ En edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo efectivo durante el tratamiento.
- ❖ La lactancia debe interrumpirse antes y durante el tratamiento, si el medico considera que es mayor el riesgo que el beneficio.



Otras advertencias de interés

No debe usar IKERVIS si tiene una infección ocular activa



Conducción

Este medicamento puede provocar visión borrosa transitoria u otras alteraciones visuales que pueden afectar a la capacidad para conducir o usar máquinas.

No conduzca ni utilice máquinas hasta que se le haya aclarado la visión.



¿Puedo tomar bebidas alcohólicas?

Evite el consumo excesivo o regular de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de hepatitis (inflamación del hígado) o interactuar con algunos de los medicamentos que está tomando

RECUERDE

- ❖ Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no deben tomarlo otras personas, aunque presenten los mismos síntomas, sin que las vea un médico.
- ❖ Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ Conserve este folleto. Contiene información útil sobre los medicamentos que usted toma.
- ❖ Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños
- ❖ Devuelva la medicación sobrante al Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ No usar el medicamento después de superada la fecha de caducidad indicada en el envase.
- ❖ En caso de **Intoxicación o sobredosis**, acuda inmediatamente a urgencias y/o llame al Servicio de Información Toxicológica: 91-562-04-20

Si tiene dudas sobre la información contenida en este folleto o si desea ayuda para planificar la toma de su medicación, no dude en consultarnos.

Consulta de Atención Farmacéutica

Teléfonos de contacto: 91-6839360

Cambio de cita: 2623/6348

Resolución de dudas: 2458/2620/2025

Horario:

- Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h
- Lunes a jueves de 16 a 19 horas

