



COPAXONE 40 MG/ML JERINGAS ACETATO DE GLATIRAMERO

¿Qué es y para qué se utiliza?


Copaxone es un medicamento, indicado para el tratamiento de las formas recurrentes de la esclerosis múltiple (EM). Modifica el modo en que funciona el sistema inmunitario de su cuerpo y se clasifica como un agente inmunomodulador. Los síntomas de la esclerosis múltiple (EM) se producen por un defecto en el sistema inmunitario del organismo. Esto produce zonas de inflamación en el cerebro y en la médula espinal. Se usa para reducir el número de veces que usted sufre brotes de EM (recaídas).

¿Cómo se toma?

Medicamento	Pauta	Cómo administrarlo
Copaxone (Acetato de glatiramer)	3 /semana, separadas 48 h L-X-V	Se administra por vía SUBCUTANEA. Saque la jeringa de la nevera media hora antes de la administración Se recomienda variar el lugar en cada administración para evitar que la piel se irrite.

Modo de administración

1. Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón.
2. Sujete la jeringa en posición vertical y retire la tapa. No toque la aguja.
3. Desinfecte la zona de inyección utilizando una gasa con alcohol y deje secar.
3. Pellizque suavemente la piel haciendo un pliegue entre el dedo pulgar e índice de la mano libre .
4. Con suavidad introduzca la aguja en la piel como se muestra



5. Inyecte el medicamento empujando el émbolo firmemente hasta el tope quedando la jeringa vacía
6. Retire la jeringa con cuidado y deséchela en el contenedor.



¿Y si se me olvida alguna administración?

Adminístrelo en cuanto lo recuerde y omítalo al día siguiente. Si es posible, debe regresar a su programa de administración habitual la semana siguiente.

Nunca duplique la dosis para compensar un olvido

¿Cómo conservarlo?



Mantenga las plumas en su envase original, **dentro de la nevera** (entre 2 y 8°C).

NO CONGELAR. Se puede conservar a Tª ambiente un solo periodo de hasta 30 días

Una vez utilizado el medicamento, deposite el dispositivo en el contenedor que le hemos facilitado. Cuando se llene 2/3 de su capacidad, ciérrelo y entréguelo en Farmacia para su correcta destrucción.



POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Algunos pacientes pueden experimentar alguno de los siguientes síntomas:

- ❖ Reacción en el lugar de inyección (enrojecimiento, picor, dolor, hinchazón, dificultad para respirar)
- ❖ Infecciones: respiratorias, gastroenteritis, herpes simplex, otitis
- ❖ Crecimientos en la piel no malignos (neoplasias benignas de piel)
- ❖ Dolor de cabeza, dolor de espalda
- ❖ Gastrointestinales: estreñimiento, náuseas
- ❖ Ansiedad, depresión, pérdida de apetito, nerviosismo, palpitaciones

CONTRAINDICACIONES



- ❖ Alergia a alguno de los componentes.



ADVERTENCIAS

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de:



Tomar otros medicamentos y Copaxone

El acetato de glatirámero puede interactuar con otros medicamento, haciendo que no funcionen correctamente o que empeoren sus posibles efectos adversos, como:

- ❖ **Corticosteroides** (aumenta la incidencia de reacciones en el lugar de la inyección).



Embarazo y lactancia

- ❖ Copaxone ha demostrado ser un fármaco seguro durante el embarazo y lactancia.
- ❖ Consulte a su médico si está embarazada o planea estarlo para evaluar la conveniencia de continuar con el tratamiento.



Otras advertencias de interés

-Al menos uno de los siguientes síntomas puede ocurrir **a los pocos minutos de una inyección** rubefacción, dolor torácico, disnea, palpitaciones o taquicardia. La mayoría de **estos síntomas son de corta duración y remiten espontáneamente sin secuelas en 30 minutos. Es conveniente que la primera vez que se administra Copaxone sea supervisado por un profesional sanitario.**

-Debe tener precaución si padece de **alteraciones cardíacas preexistentes**

-Si padece **insuficiencia renal**, se le monitorizará la función renal durante el tratamiento con Copaxone



Conducción

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas



¿Puedo tomar bebidas alcohólicas con Copaxone?

Evite el consumo excesivo o regular de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de hepatitis (inflamación del hígado).

RECUERDE

- ❖ Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no deben tomarlo otras personas, aunque presenten los mismos síntomas, sin que las vea un médico.
- ❖ Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ Conserve este folleto. Contiene información útil sobre los medicamentos que usted toma.
- ❖ Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños
- ❖ Devuelva la medicación sobrante al Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ No usar el medicamento después de superada la fecha de caducidad indicada en el envase.
- ❖ En caso de **Intoxicación o sobredosis**, acuda inmediatamente a urgencias y/o llame al Servicio de Información Toxicológica: 91-562-04-20

Si tiene dudas sobre la información contenida en este folleto o si desea ayuda para planificar la toma de su medicación, no dude en consultarnos.

Consulta de Atención Farmacéutica

Teléfonos de contacto: 91-6839360

Cambio de cita: 2623/6348

Resolución de dudas: 2458/2620/2025

Horario:

- Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h
- Lunes a jueves de 16 a 19 horas

Para CAMBIOS DE CITA o RESOLUCIÓN DE DUDAS escanee este código QR



Para consultar otra información de nuestra Página Web escanee este Código QR

