



MAVENCLAD COMPRIMIDO 10 MG CLADRIBINA

¿Qué es y para qué se utiliza?

Mavenclad se utiliza en el tratamiento de pacientes adultos diagnosticados de Esclerosis Múltiple (ES) recurrente muy activa.

La EM es una enfermedad que a largo plazo afecta al sistema nervioso central (cerebro y la médula espinal). Se caracteriza por presentar ataques repetidos (brotes) de síntomas de afectación neurológica. Estos síntomas pueden desaparecer cuando el brote llega a su fin, pero algunos pueden permanecer.

La cladribina es un fármaco citotóxico, capaz de eliminar los linfocitos, células del sistema inmune implicadas en la esclerosis múltiple, reduciendo el empeoramiento de síntomas y enlenteciendo la progresión de la enfermedad

Medicamento	Pauta	Cómo tomarlo
Mavenclad (cladribina)	<p>2 cursos de tratamiento a lo largo de 2 años.</p> <p>Cada curso : 2 semanas (semanas 1 y 5).</p> <p>Una semana de tratamiento consiste en 4 o 5 días en los que recibirá 1 o 2 comp /día</p>	<p>CON o SIN alimentos</p> <p>No se debe triturar, dividir, ni masticar</p> <p>Si toma 2 comp al día, tómelos juntos como una dosis única</p>

Es muy importante que **no deje de tomar su tratamiento y recuerde tomarlo siempre en el mismo momento del día.**



¿Y si se me olvida alguna toma?

- ❖ Una dosis olvidada debe de tomarse en cuanto se acuerde, en el mismo día, según la pauta establecida.
- ❖ Si se olvida y no se toma en el mismo día, tomar al día siguiente y ampliar en 1 el número de días de la semana de tratamiento
- ❖ Nunca duplique la dosis para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

Conserve **protegido de la humedad en el envase original.**

CONTRAINDICACIONES



- ❖ Alergia al principio activo o alguno de los excipientes
- ❖ Infección crónica o activa (tuberculosis, hepatitis vírica)
- ❖ Pacientes inmunocomprometidos (incluidos tratamientos actuales)
- ❖ Insuficiencia renal moderada o grave (Filtrado < 60 ml/min)
- ❖ Infección por VIH
- ❖ Neoplasia maligna activa
- ❖ Embarazo y lactancia

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Es posible que presente alguno o ningún de los siguientes síntomas.

Avisé a su médico si nota alguno de estos síntomas o cualquier otro:

- ❖ Mayor susceptibilidad a infecciones: herpes zoster
- ❖ Trastornos hematológicos: Linfopenia, neutropenia.
- ❖ Trastornos dermatológicos: erupción cutánea.



ADVERTENCIAS

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de:



Tomar otros medicamentos y Mavenclad

Cladribina puede interactuar con otros medicamentos, haciendo que no funcionen correctamente o que empeoren sus posibles efectos adversos:

- ❖ **Inmunosupresores** (No hay problema con tratamientos agudos y a corto plazo con corticoides sistémicos).
- ❖ **Interferón y otros tratamientos para EM:** riesgo de linfopenia
- ❖ **Carbamazepina** (hematotoxicidad)
- ❖ **Vacunas vivas atenuadas:** esperar 4- 6 semanas para iniciar Mavenclad. Riesgo de infección
- ❖ **Eltrombopag, nifedipino, nimodipino, cilostazol, sulindac, reserpina.** Evitar los días que toma Mavenclad.

Mavenclad contiene hidroxipropilbetadex, un excipiente que interfiere en la biodisponibilidad de los medicamentos, aumentándola, sobre todo de aquellos de baja solubilidad. Debe **separar la administración de cualquier otro medicamento 3 horas antes o después** de la toma de Mavenclad



Embarazo y lactancia

- ❖ Mavenclad está contraindicado durante el embarazo o la lactancia.
- ❖ Mavenclad es gametotóxico, también altera la formación de espermatozoides y óvulos, de tal forma que, **tanto hombres como mujeres en tratamiento con Mavenclad, deben utilizar métodos anticonceptivos** apropiados al menos hasta 6 meses después de tomar la última dosis



Otras advertencias de interés.

-Informe al médico que está tomando MAVENCLAD si precisara alguna transfusión sanguínea. Es posible que se necesite irradiar la sangre a transfundir previamente para evitar complicaciones.



Conducción

Mavenclad **no afecta** a su capacidad para conducir o manejar máquinas



¿Puedo tomar bebidas alcohólicas con Mavenclad?

Evite el consumo excesivo o regular de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de hepatitis (inflamación del hígado) o interactuar con algunos de los medicamentos que está tomando

RECUERDE

- ❖ Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no deben tomarlo otras personas, aunque presenten los mismos síntomas, sin que las vea un médico.
- ❖ Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ Conserve este folleto. Contiene información útil sobre los medicamentos que usted toma.
- ❖ Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños
- ❖ Devuelva la medicación sobrante al Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ No usar el medicamento después de superada la fecha de caducidad indicada en el envase.
- ❖ En caso de **Intoxicación o sobredosis**, acuda inmediatamente a urgencias y/o llame al Servicio de Información Toxicológica: 91-562-04-20

Si tiene dudas sobre la información contenida en este folleto o si desea ayuda para planificar la toma de su medicación, no dude en consultarnos.

Consulta de Atención Farmacéutica

Teléfonos de contacto: 91-6839360

Cambio de cita: 2623/6348

Resolución de dudas: 2458/2620/2025

Horario:

- Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h
- Lunes a jueves de 16 a 19 horas

Para CAMBIOS DE CITA o RESOLUCION DE DUDA S escanee este código QR



Para consultar otra información de nuestra Página Web escanee este Código QR

