



PLEGRIDY 63 / 94 / 125 MCG PLUMAS INTERFERON BETA-1A

¿Qué es y para qué se utiliza?

El interferón es una sustancia natural elaborada por su organismo para protegerle de infecciones y enfermedades. El PEGinterferón beta-1A es una forma modificada del mismo, de acción larga. Se utiliza en el tratamiento de la esclerosis múltiple remitente recidivante en pacientes adultos, evitando la aparición de brotes y el progreso de la enfermedad y la discapacidad.

¿Cómo se toma?

Medicamento	Pauta	Cómo administrarlo
Plegridy (Interferón beta 1A)	<p>Semana 0: 1º dosis de 63 mcg</p> <p>Semana 2: 2º dosis de 94 mcg</p> <p>Mantenimiento: 125 mcg / 2 semanas</p>	<p>Se administra por vía SUBCUTANEA.</p> <p>Saque la pluma de la nevera media hora antes de la administración</p> <p>Se recomienda variar el lugar en cada administración para evitar que la piel se irrite.</p>

Modo de administración

- Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón.
- Tire del tapón para quitarlo y elimínelo. No toque ni empuje el protector de la aguja, ya que podría pincharse o bloquear la pluma. La pluma de Plegridy está lista para la inyección una vez que retire el tapón.
- Limpie la zona de inyección previamente con alcohol, dejándolo secar.
- Mantenga la piel estirada o pellizcada. Coloque la pluma de Plegridy en el lugar de inyección elegido. Debe sujetar la pluma en un **ángulo de 90º** con respecto al lugar de inyección de manera que vea las rayas verdes en la ventana del estado de inyección.
- Presione la pluma sobre el lugar de inyección y espere hasta que deje de oír los clics y aparezca la marca de verificación verde.
- Levante la pluma. El protector de la aguja se extenderá para cubrir toda la aguja.
- Retire la pluma en un contenedor adecuado.



¿Y si se me olvida alguna administración?

Administrar tan pronto como sea posible. Si han pasado **menos de 7 días** desde el día habitual de administración, la siguiente dosis será en la fecha prevista. Si ha pasado más tiempo, deberá establecer un nuevo calendario, administrando la nueva dosis 2 semanas después del momento en el que se administra la dosis olvidada. **No doble nunca la dosis.**



¿Cómo conservarlo?

Mantenga las plumas en su envase original, **dentro de la nevera** (entre 2 y 8°C). **NO CONGELAR.** **Se puede conservar a Tª ambiente hasta 30 días en total.** Conservar protegido de la luz. Una vez utilizado el medicamento, deposite el dispositivo en el contenedor que le hemos facilitado. Cuando se llene 2/3 de su capacidad, ciérralo y entréguelo en Farmacia para su correcta destrucción.



CONTRAINDICACIONES

- ❖ Alergia a alguno de los componentes.
- ❖ Depresión o pensamientos suicidas



Consulta de Atención Farmacéutica

Teléfonos de contacto: 91-6839360 ext. 2458/2620/2025



POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

- ❖ Reacción en el lugar de inyección (rojez, picor, dolor, etc.)
- ❖ **Síntomas pseudogripales** (dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular). Más acusados al inicio. Para minimizar estos efectos, póngase Plegridy antes de acostarse, tome paracetamol o ibuprofeno media hora antes de la inyección y beba bastante agua).
- ❖ Dolor de cabeza, dolor muscular y de las articulaciones.
- ❖ Malestar, náuseas y vómitos.
- ❖ Depresión, tristeza, ansiedad.
- ❖ Elevación asintomática de enzimas hepáticas (transaminasas).
- ❖ Diminución del número de plaquetas .



ADVERTENCIAS

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de:



Embarazo y lactancia

- ❖ Si es clínicamente necesario, se puede considerar el uso de Plegridy durante el embarazo
- ❖ Plegridy se puede utilizar durante la lactancia



Otras advertencias de interés

-Se debe tener precaución cuando se administre Plegridy a pacientes con insuficiencia renal grave, antecedentes de epilepsia, enfermedad cardíaca preexistente o con insuficiencia hepática.



Conducción

La influencia sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.



¿Puedo tomar bebidas alcohólicas con x?

Evite el consumo excesivo o regular de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de hepatitis (inflamación del hígado) o interactuar con algunos de los medicamentos que está tomando.

RECUERDE

- ❖ Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no deben tomarlo otras personas, aunque presenten los mismos síntomas, sin que las vea un médico.
- ❖ Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ Conserve este folleto. Contiene información útil sobre los medicamentos que usted toma.
- ❖ Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños
- ❖ Devuelva la medicación sobrante al Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ No usar el medicamento después de superada la fecha de caducidad indicada en el envase.
- ❖ En caso de **Intoxicación o sobredosis**, acuda inmediatamente a urgencias y/o llame al Servicio de Información Toxicológica: 91-562-04-20

Si tiene dudas sobre la información contenida en este folleto o si desea ayuda para planificar la toma de su medicación, no dude en consultarnos.

Consulta de Atención Farmacéutica

Teléfonos de contacto: 91-6839360

- Cambio de cita: 2623/6348

- Resolución de dudas: 2458/2620/2025

Horario:

- Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h
- Lunes a jueves de 16 a 19 horas

Para CAMBIOS DE CITA o RESOLUCION DE DUDAS escanee este código QR



Para consultar otra información de nuestra Página Web escanee este Código QR

