



MAYZENT COMPRIMIDOS SIPONIMOD

¿Qué es y para qué se utiliza?

Mayzent se utiliza para tratar la esclerosis múltiple (EM) secundaria progresiva considerada como activa. Se emplea en pacientes adultos.

La EM es una enfermedad que a largo plazo afecta al sistema nervioso central (cerebro y la médula espinal). Se caracteriza por presentar ataques repetidos (brotes) de síntomas de afectación neurológica. Estos síntomas pueden desaparecer por completo cuando el brote llega a su fin, pero algunos problemas pueden permanecer. El siponimod es un agente inmunomodulador que ajusta el sistema inmunológico para limitar el daño al sistema nervioso, bloqueando la capacidad de los linfocitos de salir de los ganglios linfáticos, causando una redistribución y, a su vez, una disminución de los linfocitos. Esto limita la inflamación que provoca el daño de los nervios de la EM.

¿Cómo se toma?

Medicamento	Pauta	Cómo tomarlo
Mayzent (siponimod)	<p>- Inicio del tratamiento (Mayzent 0,25 mg): Día 1: 1 comprimido Día 2: 1 comprimido Día 3: 2 comprimidos Día 4: 3 comprimidos Día 5: 5 comprimidos</p> <p>- Mantenimiento del tratamiento (Mayzent 2 mg): Día 6 y en adelante: 1 comprimido</p>	<p>CON o SIN alimentos</p> <p>Se deben tragar los comprimidos enteros con agua</p> <p>Durante los 6 primeros días de tratamiento, tomar la dosis por la mañana</p>

Es muy importante que **no deje de tomar su tratamiento y recuerde tomarlo siempre en el mismo momento del día.**

¿Y si se me olvida alguna toma?

- ❖ Si omite una toma en los 6 primeros días de tratamiento, se debe reiniciar el tratamiento con un nuevo envase de **Mayzent 0,25 mg**.
- ❖ Si omite una toma después del día 6 de tratamiento, se debe tomar la siguiente dosis de **Mayzent 2 mg** de manera normal. Nunca duplique la dosis para compensar un olvido.

¿Cómo conservarlo?

No conservar a temperatura superior a 25°C.

CONTRAINDICACIONES

- ❖ Hipersensibilidad al principio activo, o al cacahuete, soja, lactosa o alguno de los excipientes
- ❖ Síndrome de inmunodeficiencia
- ❖ Antecedentes de leucoencefalopatía multifocal progresiva o de meningitis criptocócica
- ❖ Procesos cancerígenos activos
- ❖ Insuficiencia hepática grave
- ❖ Problemas cardíacos
- ❖ Embarazo
- ❖ Pacientes homocigóticos para el genotipo CYP2C9*3 (CYP2C9*3*3) (metabolizador pobre)

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Es posible que presente alguno o ninguno de los siguientes síntomas.

- ❖ Trastornos nerviosos: cefalea, mareo, convulsión, temblor
- ❖ Trastornos vasculares: hipertensión
- ❖ Mayor susceptibilidad a infecciones: herpes zóster
- ❖ Trastornos dermatológicos: lunares o manchas en la piel
- ❖ Trastornos hematológicos: disminución de células inmunes (linfocitos)
- ❖ Exploraciones complementarias: aumento de los valores en la prueba de la función hepática
- ❖ Otras: disminución del ritmo cardíaco, edema macular, náuseas, diarrea, astenia, dolor en una extremidad, edema periférico, disminución de los valores en la prueba de la función pulmonar



ADVERTENCIAS

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de:

Tomar otros medicamentos y Mayzent

Mayzent (Siponimod) puede interactuar con otros medicamentos, haciendo que no funcionen correctamente o que empeoren sus posibles efectos adversos:

- ❖ Se debe tener precaución durante la administración de este medicamento junto con **antineoplásicos, inmunomoduladores o inmunosupresores** por posible riesgo de efectos añadidos sobre el sistema inmune
- ❖ Se debe evitar el uso de **vacunas de microorganismos vivos atenuados**, por conllevar un riesgo de infección
- ❖ No se debe iniciar en pacientes que estén tomando sustancias que **pueden reducir el ritmo cardiaco**, tales como algunos **antiarrítmicos, bloqueadores de los canales de calcio** (verapamilo o diltiazem), u otros como **ivabradina o digoxina**.

Se debe tener precaución al iniciar el tratamiento de Siponimod en pacientes que tomen **betabloqueantes**. Medicamentos que aumentan los niveles de Mayzent en la sangre como por ejemplo **fluconazol**

- ❖ Medicamentos que disminuyen los niveles de Mayzent en la sangre como por ejemplo **carbamazepina o modafinilo**

Embarazo y lactancia

- ❖ Está contraindicado utilizar Siponimod durante el embarazo
- ❖ Si está en edad fértil, utilice métodos anticonceptivos apropiados durante el tratamiento y hasta 10 días después de suspenderlo
- ❖ Si planea quedarse embarazada consulte antes con su médico.
- ❖ **Si se queda embarazada durante el tratamiento con Siponimod, se debe discontinuar el tratamiento**
- ❖ Está contraindicada la lactancia materna durante el tratamiento con Siponimod.

Otras advertencias de interés

- Si interrumpe el tratamiento con Mayzent debe esperar 10 días sin recibir ningún tratamiento nuevo.
 - **Evite la exposición a la luz solar sin protección.**
 - No debe recibir fototerapia con radiación UVB ni fotoquimioterapia PUVA mientras tome el tratamiento
 - Mayzent **puede afectar al funcionamiento del hígado**. Si tiene o ha tenido en el pasado, algún problema hepático debe ponerlo en conocimiento de su médico.
- Durante el tratamiento, e incluso algún tiempo después, es necesario realizarle análisis para asegurarse de que el hígado está funcionando adecuadamente.

Contacte con su médico inmediatamente si nota que aparece alguno de los siguientes síntomas:

- Coloración amarillenta de la piel o el blanco de los ojos.
- Orina de color oscuro (amarronado).
- Dolor en el lado derecho del abdomen.
- Menos apetito del habitual, cansancio, náuseas y/o vómitos.
- No debe tomar Mayzent si es alérgico al cacahuete o soja, o si tiene problemas para tolerar la lactosa, dado que los comprimidos de Mayzent contienen lecitina de soja y lactosa.

Conducción

Sólo al iniciar el tratamiento con Mayzent ocasionalmente puede aparecer **mareo o somnolencia**.

¿Puedo tomar bebidas alcohólicas con Mayzent?

Evite el consumo excesivo o regular de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de hepatitis (inflamación del hígado) o interactuar con algunos de los medicamentos que está tomando



RECUERDE

- ❖ Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no deben tomarlo otras personas, aunque presenten los mismos síntomas, sin que las vea un médico.
- ❖ Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ Conserve este folleto. Contiene información útil sobre los medicamentos que usted toma.
- ❖ Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños
- ❖ Devuelva la medicación sobrante al Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ No usar el medicamento después de superada la fecha de caducidad indicada en el envase.
- ❖ En caso de **intoxicación o sobredosis**, acuda inmediatamente a urgencias y/o llame al Servicio de Información Toxicológica: 91-562-04-20

Si tiene dudas sobre la información contenida en este folleto o si desea ayuda para planificar la toma de su medicación, no dude en consultarnos.

Consulta de Atención Farmacéutica

Teléfono de contacto: 91-6839360

Cambio de cita: 2623/6348

Resolución de dudas: 2458/2620/2025

Horario:

- Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h
- Lunes a jueves de 16 a 19 horas

Para CAMBIOS DE CITA o RESOLUCIÓN DE DUDAS escanee este código QR



Para consultar otra información de nuestra Página Web escanee este Código QR



Hospital Universitario de Getafe

Comunidad de Madrid