



## AUBAGIO COMPRIMIDOS 14 MG TERIFLUNOMIDA

### ¿Qué es y para qué se utiliza?

**Aubagio se utiliza para tratar la esclerosis múltiple remitente-recurrente en pacientes adultos.**

Es una enfermedad que a largo plazo afecta al sistema nervioso central (cerebro y la médula espinal).

Se caracteriza por presentar ataques repetidos (brotes) de síntomas de afectación neurológica.

Estos síntomas pueden desaparecer por completo cuando el brote llega a su fin, pero algunos problemas pueden permanecer.

La teriflunomida es un agente inmunomodulador que ajusta el sistema inmunológico limitando el crecimiento de algunas células blancas (linfocitos). Esto disminuye la inflamación que provoca el daño de los nervios de la EM.

### ¿Cómo se toma?

Medicamento	Pauta	Cómo tomarlo
<b>Aubagio (teriflunomida)</b>	<b>1 comprimido al día</b>	<b>CON o SIN alimentos No se debe triturar, dividir, ni masticar</b>

Es muy importante que **no deje de tomar su tratamiento y recuerde tomarlo siempre en el mismo momento del día.**



### ¿Y si se me olvida alguna toma?

❖ **Nunca duplique la dosis para compensar un olvido.**



### ¿Cómo conservarlo?

Conserve este medicamento a temperatura ambiente, lejos de las fuentes de calor y frío.

### CONTRAINDICACIONES



- ❖ Alergia al principio activo o a alguno de los excipientes.
- ❖ Insuficiencia hepática grave e insuficiencia renal grave en tratamiento con diálisis
- ❖ Inmunodeficiencia graves
- ❖ Deterioro de la función de la médula ósea (anemia, leucopenia, neutropenia o trombocitopenia)
- ❖ Infección activa grave
- ❖ Hipoproteinemia grave, por ejemplo, síndrome nefrótico

### POSIBLES EFECTOS ADVERSOS


**Es posible que presente alguno o ninguno de los siguientes síntomas:**

- ❖ Mayor susceptibilidad a infecciones: infecciones respiratorias, infecciones de orina, sinusitis, herpes bucal.
- ❖ Trastornos dermatológicos: pérdida de grosor, densidad y caída del cabello (no pérdida total).
- ❖ Trastornos en sistema nervioso: Cefaleas, ansiedad, hormigueo
- ❖ Trastornos digestivos: Náuseas, diarrea, alteración de enzimas hepáticas
- ❖ Dolor muscular, óseo o articular.
- ❖ Aumento de la presión arterial
- ❖ Acné, picor
- ❖ Menstruación abundante



## ADVERTENCIAS

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de:



### Tomar otros medicamentos y Aubagio

**Teriflunomida** puede interactuar con otros medicamentos, haciendo que no funcionen correctamente o que empeoren sus posibles efectos adversos:

- ❖ **Rifampicina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína e hipérico**
- ❖ **Colestiramina o carbón activado** (disminución de efectividad de teriflunomida)
- ❖ **Repaglinida, paclitaxel, pioglitazona o rosiglitazona** (aumento de sus efectos adversos)
- ❖ **Duloxetina, teofilina** podrían ver su eficacia disminuida
- ❖ **Warfarina**
- ❖ **Metrotexato, doxorubicina, estatinas, repaglinida**
- ❖ **El uso de vacunas atenuadas vivas se debe evitar**



### Embarazo y lactancia

- ❖ Está contraindicado utilizar Aubagio durante el embarazo
- ❖ Si está en edad fértil, utilice métodos anticonceptivos apropiados
- ❖ Si planea quedarse embarazada consulte antes con su médico.
- ❖ **Ante cualquier motivo que haga sospechar un embarazo, se debe avisar al médico**
- ❖ Está contraindicada la lactancia materna durante el tratamiento con Aubagio



### Otras advertencias de interés. Avise a su médico si presenta síntomas de infección:

- Fiebre, tos persistente, malestar, pérdida de peso, dolor al orinar.
- Hormigueo, entumecimiento, visión doble, debilidad en brazos y piernas.
- Dificultad para respirar o hinchazón de los pies.



### Conducción

La influencia de Aubagio sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante



### ¿Puedo tomar bebidas alcohólicas con Tecfidera?

Evite el consumo excesivo o regular de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de hepatitis (inflamación del hígado) o interactuar con algunos de los medicamentos que está tomando

### RECUERDE

- ❖ Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no deben tomarlo otras personas, aunque presenten los mismos síntomas, sin que las vea un médico.
- ❖ Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ Conserve este folleto. Contiene información útil sobre los medicamentos que usted toma.
- ❖ Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños
- ❖ Devuelva la medicación sobrante al Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ No usar el medicamento después de superada la fecha de caducidad indicada en el envase.
- ❖ En caso de **Intoxicación o sobredosis**, acuda inmediatamente a urgencias y/o llame al Servicio de Información Toxicológica: 91-562-04-20

**Si tiene dudas sobre la información contenida en este folleto o si desea ayuda para planificar la toma de su medicación, no dude en consultarnos.**

### Consulta de Atención Farmacéutica

**Teléfonos de contacto:** 91-6839360

- Cambio de cita: 2623/6348
- Resolución de dudas: 2458/2620/2025

### Horario:

- Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h
- Lunes a jueves de 16 a 19 horas

Para CAMBIOS DE CITA o RESOLUCIÓN DE DUDAS escanee este código QR



Para consultar otra información de nuestra Página Web escanee este Código QR

