Hospital Universitario de Getafe

Comunidad de Madrid

# ENTECAVIR 0,5 mg comp

## ¿Qué es y para qué se utiliza?

Entecavir es un medicamento antiviral que reduce la cantidad de virus de la hepatitis B del organismo, mejorando el estado del hígado

## ¿Cómo se toma?

| Dosis | Pauta | Cómo tomarlo |
|---|---|---|
| ENTECAVIR 0,5 mg comp | 1 comprimido al día | Vía oral CON o SIN alimentos |

Es muy importante que **no deje de tomar su tratamiento y recuerde tomarlo siempre en el mismo momento del día.**

## ¿ Y si se me olvida alguna toma?

- Debe tomar el medicamento tan pronto como sea si no han pasado mas de **12 horas** desde la última toma.
- **Nunca duplique la dosis para compensar un olvido.**

.

## ¿Cómo conservarlo?

Conserve este medicamento a **temperatura ambiente**, lejos de las fuentes de calor y frio.

## CONTRAINDICACIONES

- Alergia a alguno de los componentes.

## POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Alguno de los siguientes efectos adversos pueden aparecer en algunas personas:

- Diarrea, vómitos, náuseas,
- Dolor de cabeza, mareos
- Insomnio o somnnolencia
- Debilidad, cansancio
- Erupción cutánea

**Consulta de Atención Farmacéutica**
**Teléfonos de contacto:** 91-6839360 ext. 2458/2620/2025

## ADVERTENCIAS

***Consulte a su médico o farmacéutico en caso de:***

### Tomar otros medicamentos y Entecavir

Es poco probable que entecavir interaccione con otros medicamentos de su tratamiento.

### Embarazo y lactancia

- ❖ No se recomienda el uso de entecavir durante el embarazo salvo que sea estrictamente necesario.
- ❖ Avise a su médico si está embarazada o si planea estarlo.
- ❖ No debe dar el pecho durante el tratamiento; si lo está haciendo, comuníqueselo a su médico.

### Conducción

Si nota mareo o fatiga durante el tratamiento con entecavir, no conduzca ni maneje herramientas o máquinas.

### ¿Puedo tomar bebidas alcohólicas con Entecavir?

Evite el consumo de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de hepatitis (inflamación del hígado).

### Lactosa

Entecavir comprimidos puede contener lactosa. Los pacientes con intolerancia hederitaria a galactosa, insuficiencia total de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.

**Entecavir no impide totalmente que contagie a otras personas mediante contacto sexual o líquidos corporales, por lo que deberá tomar las medidas oportunas para evitar el contagio.**

***RECUERDE***

- ❖ Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no deben tomarlo otras personas, aunque presenten los mismos síntomas, sin que las vea un médico.
- ❖ Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ Conserve este folleto. Contiene información útil sobre los medicamentos que usted toma.
- ❖ Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños
- ❖ Devuelva la medicación sobrante al Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ No usar el medicamento después de superada la fecha de caducidad indicada en el envase.
- ❖ En caso de **Intoxicación o sobredosis**, acuda inmediatamente a urgencias y/o llame al Servicio de Información Toxicológica: 91-562-04-20

***Si tiene dudas sobre la información contenida en este folleto o si desea ayuda para planificar la toma de su medicación, no dude en consultarnos.***

## Consulta de Atención Farmacéutica

**Teléfonos de contacto:** 91-6839360
- Cambio de cita: 2623/6348
- Resolución de dudas: 2458/2620/2025

**Horario:**

- Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h
- Lunes a jueves de 16 a 19 horas

SaludMadrid
Hospital Universitario de Getafe
Comunidad de Madrid