



## EMGALITY PLUMA PRECARGADA 120 MG GALCANEZUMAB

### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Emgality contiene galcanezumab, un medicamento que actúa bloqueando la molécula CGRP (péptido relacionado con el gen de la calcitonina), que se ha relacionado con la migraña.





Se utiliza para la prevención de la migraña en adultos con al menos 8 días de migraña al mes que hayan fracasado a al menos 3 tratamientos incluida la toxina votulínica.

Medicamento	Pauta	Cómo administrarlo
<b>Emgality (galcanezumab)</b>	<b>1º dosis: 2 plumas (240 mg)</b> <b>Mantenimiento: 1 pluma / 30 días</b>	<b>Se administra por vía SUBCUTANEA.</b> <b>Saque la pluma de la nevera media hora antes de la administración</b> <b>Se recomienda variar el lugar en cada administración para evitar que la piel se irrite.</b>

### Modo de administración



1. Lávese las manos cuidadosamente
2. Sujete la pluma en posición vertical y retire la tapa. No toque la aguja.
3. Desinfecte la zona de inyección utilizando un algodón con alcohol
4. Mantenga la piel estirada o pellizcada. Una vez retirado el capuchón, sitúe la pluma sobre la piel con un ángulo de 90 **grados**.
5. Presione la pluma a 90 grados sobre la piel y gire el anillo de bloqueo hacia la posición de desbloqueo
6. Pulse el botón superior y mantenga durante unos 15 segundos



Sabrás que su inyección ha terminado cuando pueda ver el émbolo gris.

6. Verá como el émbolo de la pluma comienza a bajar hasta que suena un segundo "click"
7. Retire la pluma con cuidado y deséchela en el contenedor.



### ¿Y si se me olvida alguna administración?

Deberá inyectársela tan pronto como sea posible. Luego contacte con su médico para que le indique cuándo administrar la siguiente **No doble nunca la dosis.**

### ¿Cómo conservarlo?

Mantenga las plumas en su envase original, **dentro de la nevera** (entre 2 y 8°C). **NO CONGELAR.** **Se puede conservar a Tª ambiente un solo periodo de hasta 30 días**

Una vez utilizado el medicamento, deposite el dispositivo en el contenedor que le hemos facilitado. Cuando se llene 2/3 de su capacidad, ciérrelo y entréguelo en Farmacia para su correcta destrucción.



### POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Avisé a su médico si nota cualquiera de estos síntomas o algún otro no mencionado aquí:

- ❖ Reacción en el lugar de inyección (enrojecimiento, picor, dolor, hinchazón)
- ❖ Estreñimiento
- ❖ Vértigos

### CONTRAINDICACIONES



- ❖ Alergia a alguno de los componentes.
- ❖ Enfermedad cardiovascular grave



## ADVERTENCIAS

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de:



### Tomar otros medicamentos y EMGALITY

Dado que galcanezumab es un medicamento biológico, no se prevén efectos sobre otros medicamentos. Informe a su médico o farmacéutico si ha utilizado o está utilizando otros medicamentos para revisarlos.



### Embarazo y lactancia

- ❖ No se recomienda durante la lactancia, ni en el embarazo.
- ❖ Utilice **métodos anticonceptivos** eficaces durante el tratamiento.
- ❖ Si pretende quedarse embarazada informe a su médico o farmacéutico



### Otras advertencias de interés:

- **No** contiene látex



### Conducción

La influencia de EMGALITY sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.



### ¿Puedo tomar bebidas alcohólicas?

Evite el consumo excesivo o regular de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de hepatitis (inflamación del hígado) o interactuar con algunos de los medicamentos que está tomando

## RECUERDE

- ❖ Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no deben tomarlo otras personas, aunque presenten los mismos síntomas, sin que las vea un médico.
- ❖ Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ Conserve este folleto. Contiene información útil sobre los medicamentos que usted toma.
- ❖ Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños
- ❖ Devuelva la medicación sobrante al Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ No usar el medicamento después de superada la fecha de caducidad indicada en el envase.
- ❖ En caso de **Intoxicación o sobredosis**, acuda inmediatamente a urgencias y/o llame al Servicio de Información Toxicológica: 91-562-04-20

*Si tiene dudas sobre la información contenida en este folleto o si desea ayuda para planificar la toma de su medicación, no dude en consultarnos.*

## Consulta de Atención Farmacéutica

Teléfonos de contacto: 91-6839360

- Cambio de cita: 2623/6348

- Resolución de dudas: 2458/2620/2025

### Horario:

- Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h
- Lunes a jueves de 16 a 19 horas

Para CAMBIOS DE CITA o RESOLUCIÓN DE DUDAS escanee este código QR



Para consultar otra información de nuestra Página Web escanee este Código QR

