



## DUPIXENT 300MG PLUMA DUPILUMAB

### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Dupixent® contiene Dupilumab, un medicamento utilizado para la dermatitis atópica de moderada a grave que actúa reduciendo la inflamación y el eccema cuando la respuesta a otros fármacos ha sido insuficiente o bien en pacientes que padezcan una dermatitis severa. Se puede usar con o sin corticosteroides tópicos, los cuales se deben reservar para áreas problemáticas.

### ¿Cómo se toma?

Medicamento	Pauta	Cómo administrarlo
Dupilumab	<b>Dosis inicial de 600 mg</b> (dos inyecciones de 300 mg) <b>seguida de 300 mg cada dos semanas.</b> <b>En adolescentes y niños la dosis puede variar.</b>	<b>Pluma por vía subcutánea</b>



### Modo de administración: Dupilumab se administra por vía SUBCUTANEA.

- Saque la pluma de la nevera media hora antes de la administración
- Seleccionar el lugar de inyección: en el muslo o abdomen evitando el área a 5 cm del ombligo. Se recomienda variar el lugar en cada administración para evitar que la piel se irrite.
- Retire el capuchón gris.
- Coloque la cubierta amarilla de la aguja sobre la piel formando un ángulo de 90º y aguante la pluma de forma que le permita ver la ventana.
- Presione hacia abajo firme contra la piel hasta que no pueda ver la cubierta amarilla y manténgala así. Sonará un clic cuando comience la inyección que puede tardar 20 segundo. Compruebe que toda la ventana se ha vuelto amarillo. Luego cuente 5 y tire recto hacia arriba.



### ¿Y si se me olvida alguna administración?

Si olvida una dosis deberá inyectársela lo antes posible. A continuación, siga la dosificación según la pauta establecida. No se inyecte una dosis doble para compensar la dosis olvidada.



### ¿Cómo conservarlo?

**Conserve este medicamento en nevera (2-8ºC). No congelar**

Una vez utilizado el medicamento, deposite el dispositivo en el contenedor que le hemos facilitado. Cuando se llene 2/3 de su capacidad, ciérrelo y entrégalo en Farmacia para su correcta destrucción.

Se puede conservar fuera de la nevera durante un único período de hasta 14 días a temperatura no >25ºC

### CONTRAINDICACIONES

- ❖ Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes



### POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Los más frecuentes son:

- Reacción en el lugar de inyección (enrojecimiento, hinchazón y picor) pero suele desaparecer después del primer mes.
- Conjuntivitis, blefaritis (inflamación de párpados), eosinofilia y herpes oral.

Si tiene algún efecto secundario (mencionado aquí) póngalo en conocimiento de su médico.

### Avisé inmediatamente a su médico si tiene:

- Fiebre alta, cefalea, malestar general
- Inflamación ganglios linfáticos
- Habones, picor, erupción cutánea
- Dolor en las articulaciones

## ADVERTENCIAS

- Puede debilitar su resistencia a la infecciones causadas por parásitos intestinales (helmintos). Informe si tiene diarrea, gases, malestar estomacal...
- Suspender administración ante reacción de hipersensibilidad.
- Consulte a su médico si aparecen o empeoran problemas oculares (dolor, cambios en la vista)
- Si tiene asma, póngalo en conocimiento de su médico.



### Interacción con otros medicamentos

**Las vacunas vivas y vivas atenuadas** no se deben administrar simultáneamente con dupilumab, ya que no se ha establecido la seguridad y la eficacia clínica.



### Embarazo y lactancia

Consulte con su médico si está embarazada o cree estarlo, y si está dando el pecho, se debe analizar el beneficio/riesgo de Dupixent durante el embarazo



### Conducción

La influencia de dupilumab sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.



### ¿Puedo tomar bebidas alcohólicas con x?

Evite el consumo excesivo o regular de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de hepatitis (inflamación del hígado) o interactuar con algunos de los medicamentos que está tomando.

## RECUERDE

- ❖ Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no deben tomarlo otras personas, aunque presenten los mismos síntomas, sin que las vea un médico.
- ❖ Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ Conserve este folleto. Contiene información útil sobre los medicamentos que usted toma.
- ❖ Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños
- ❖ Devuelva la medicación sobrante al Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ No usar el medicamento después de superada la fecha de caducidad indicada en el envase.
- ❖ En caso de **Intoxicación o sobredosis**, acuda inmediatamente a urgencias y/o llame al Servicio de Información Toxicológica: 91-562-04-20

**Si tiene dudas sobre la información contenida en este folleto o si desea ayuda para planificar la toma de su medicación, no dude en consultarnos.**

## Consulta de Atención Farmacéutica

**Teléfonos de contacto:** 91-6839360 ext. 2458/2620/2025

### Horario:

- Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h
- Lunes a jueves de 16 a 19 horas

