



## BIKTARVY 50mg/25mg/200mg comp Bictegravir/Tenofovir alafenamida/Emtricitabina

### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Biktarvy® es un medicamento antirretroviral indicado en para el tratamiento en adultos y adolescentes mayores de 18 años infectados del VIH-1.

Se utiliza con el fin de disminuir la cantidad de virus en su sangre haciéndolo indetectable, sin embargo no es una cura para la infección. El tratamiento pretende aumentar las defensas del organismo para hacer frente a las distintas infecciones.

### ¿Cómo se toma?

Dosis	Pauta	Cómo tomarlo
BIKTARVY 50mg/25mg/200mg comp	1 comprimido	CON o SIN alimentos No masticar, machacar o dividir el comprimido

Es muy importante que **no deje de tomar su tratamiento y recuerde tomarlo siempre en el mismo momento del día.**



### ¿Y si se me olvida alguna toma?

- ❖ Debe tomar el medicamento tan pronto como sea si no han pasado mas de **18 horas** desde la última toma.
- ❖ **Nunca duplique la dosis para compensar un olvido.**
- ❖ Si **vomita** antes de que transcurra **1 hora** tras haber tomado el comprimido, tome otro.



### ¿Cómo conservarlo?

Conserve este medicamento a **temperatura ambiente**, lejos de las fuentes de calor y frío.

### CONTRAINDICACIONES



- ❖ Alergia a alguno de los componentes.
- ❖ Administración junto con rifampicina y/o hierba de san juan (*Hypericum perforatum*)

Si está tomando alguno de estos medicamentos, **no tome Biktarvy y consulte a su médico inmediatamente.**

### POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Avisé a su médico si nota cualquiera de estos síntomas:

- ❖ Signos de inflamación o infección
- ❖ Dolor articular, rigidez o problemas óseos especialmente en la cadera, rodilla y hombro (osteonecrosis)
- ❖ Debilidad muscular, de inicio en las manos y los pies y que se desplaza hacia el tronco.
- ❖ Trastornos del sueño: sueños anormales.
- ❖ Depresión
- ❖ Trastornos digestivos: náuseas, vómitos, diarrea, gases y molestias después de las comidas
- ❖ Mareos, cefalea, fatiga
- ❖ Puede alterar algunos niveles en los análisis de sangre.



# ADVERTENCIAS

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de:



## Tomar otros medicamentos y Biktarvy

Biktarvy puede interactuar con otros medicamento, haciendo que no funcionen con que empeoren sus posibles efectos adversos, como:



### ❖ Antiácidos de aluminio o magnesio y suplementos de hierro:

Tome Biktarvy 2h antes o después de tomar el antiácido o el suplemento de hierro.

### ❖ Antibióticos: azitromicina, claritromicina, rifabutina, rifapentina

### ❖ Inmunosupresores utilizados tras un transplante, como ciclosporina.

### ❖ Algunos antiepilépticos



## Embarazo y lactancia

❖ Si está tomando Biktarvy durante su embarazo, se le realizarán análisis de sangre periódicos y otras pruebas para controlar el desarrollo del niño.

❖ Se recomienda la lactancia materna para evitar la posible transmisión del VIH. Si realmente desea amamantar, hable primero con su médico.



## Problemas hepáticos

Informe a su médico si tiene hepatitis B u otros problemas hepáticos.



## Conducción

Si nota mareo durante el tratamiento con Biktarvy, no conduzca ni maneje herramientas o máquinas.



## ¿Puedo tomar bebidas alcohólicas con Biktarvy?

Evite el consumo excesivo o regular de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de hepatitis (inflamación del hígado) o interactuar con algunos de los medicamentos que está tomando

## RECUERDE

- ❖ Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no deben tomarlo otras personas, aunque presenten los mismos síntomas, sin que las vea un médico.
- ❖ Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ Conserve este folleto. Contiene información útil sobre los medicamentos que usted toma.
- ❖ Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños
- ❖ Devuelva la medicación sobrante al Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ No usar el medicamento después de superada la fecha de caducidad indicada en el envase.
- ❖ En caso de **Intoxicación o sobredosis**, acuda inmediatamente a urgencias y/o llame al Servicio de Información Toxicológica: 91-562-04-20

**Si tiene dudas sobre la información contenida en este folleto o si desea ayuda para planificar la toma de su medicación, no dude en consultarnos.**

## Consulta de Atención Farmacéutica

Teléfonos de contacto: 91-6839360

- Cambio de cita: 2623/6348

- Resolución de dudas: 2458/2620/2025

### Horario:

- Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h
- Lunes a jueves de 16 a 19 horas

Para CAMBIOS DE CITA o RESOLUCIÓN DE DUDAS escanee este código QR



Para consultar otra información de nuestra Página Web escanee este Código QR

