



DOVATO 50MG / 300 MG COMPRIMIDOS DOLUTEGRAVIR / LAMIVUDINA

¿Qué es y para qué se utiliza?

Dovato® es un medicamento antirretroviral indicado en para el tratamiento en adultos y adolescentes mayores de 12 años con infección por VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana).

Se utiliza con el fin de disminuir la cantidad de virus en su sangre haciéndolo indetectable, sin embargo no es una cura para la infección. El tratamiento pretende aumentar las defensas del organismo para hacer frente a las distintas infecciones.

No dude en preguntar al médico o farmacéutico sobre los beneficios de la terapia antirretroviral y los consejos para cumplir más fácilmente el tratamiento.

¿Cómo se toma?

Medicamento	Pauta	Cómo tomarlo
Dovato	1 comprimido al día	CON o SIN alimentos No masticar, machacar ni dividir el comprimido

Es muy importante que **no deje de tomar su tratamiento** y **recuerde tomarlo siempre en el mismo momento del día.**



¿Y si se me olvida alguna toma?

- ❖ Debe tomar el medicamento tan pronto como sea si no han pasado mas de **20 horas** desde la última toma.
- ❖ **Nunca duplique la dosis para compensar un olvido.**



¿Cómo conservarlo?

Conserve este medicamento a temperatura ambiente.

CONTRAINDICACIONES



- ❖ Alergia a alguno de los componentes.
- ❖ Lactancia

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Es probable que no todos o ninguno de los siguientes efectos adversos aparezcan durante el tratamiento. Avise a su médico si nota cualquiera de estos síntomas u cualquier otro no mencionado aquí :

- ❖ Trastornos del sueño: insomnio y sueños anormales.
- ❖ Trastornos digestivos: náuseas, diarrea, vómitos, gases y dolor abdominal.
- ❖ Mareos, cefalea, fatiga
- ❖ Erupción, prurito
- ❖ Puede alterar algunos niveles en los análisis de sangre.



ADVERTENCIAS

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de:



Tomar otros medicamentos y Dovato

Dovato puede interaccionar con otros medicamento, haciendo que no funcionen correctamente o que empeoren sus posibles efectos adversos, como:

- ❖ **Antiácidos con Aluminio o Magnesio** puede reducir la absorción de dolutegravir, se recomienda espaciarlo en el tiempo: **se tomará el antiácido 6h antes o 2h después.**
- ❖ Suplementos de **calcio, hierro o multivitamínicos**: tomar **6h antes o 2h después.**
- ❖ **Metformina**: advertir al médico si se está tomando ya que puede ser necesario un ajuste de dosis
- ❖ **Hierba de San Juan** (*Hypericum perforatum*): evitar su uso a la vez que este medicamento.
- ❖ Ciertos **antiepilépticos**: consultar al medico.
- ❖ Rifampicina, cladribina

Embarazo y lactancia



- ❖ Se recomienda usar un método anticonceptivo eficaz mientras esté tomando este medicamento.
- ❖ Si planea quedarse embarazada mientras toma Dovato, consulte antes con su médico.
- ❖ Se recomienda no dar lactancia materna para evitar posibles transmisiones del VIH



Conducción

La influencia de Dovato sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Puede producirse mareo y somnolencia durante el tratamiento con dolutegravir.



¿Puedo tomar bebidas alcohólicas con Dovato?

Evite el consumo excesivo o regular de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de hepatitis (inflamación del hígado) o interaccionar con algunos de los medicamentos que está tomando

RECUERDE

- ❖ Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no deben tomarlo otras personas, aunque presenten los mismos síntomas, sin que las vea un médico.
- ❖ Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ Conserve este folleto. Contiene información útil sobre los medicamentos que usted toma.
- ❖ Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños
- ❖ Devuelva la medicación sobrante al Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ No usar el medicamento después de superada la fecha de caducidad indicada en el envase.
- ❖ En caso de **Intoxicación o sobredosis**, acuda inmediatamente a urgencias y/o llame al Servicio de Información Toxicológica: 91-562-04-20

Si tiene dudas sobre la información contenida en este folleto o si desea ayuda para planificar la toma de su medicación, no dude en consultarnos.

Consulta de Atención Farmacéutica

Teléfonos de contacto: 91-6839360

Cambio cita: 2623/6348

Consultas: 2458/2620/2025

Horario:

- Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h
- Lunes a jueves de 16 a 19 horas

Para CAMBIOS DE CITA o RESOLUCIÓN DE DUDAS escanee este código QR



Para consultar otra información de nuestra Página Web escanee este Código QR



Hospital Universitario de Getafe

Comunidad de Madrid

