

LAMIVUDINA

LAMIVUDINA® 150 mg ó 300mg comprimidos



Servicio de Farmacia
HGU Gregorio Marañón

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Lamivudina es un fármaco antirretroviral, inhibidor de la transcriptasa inversa, que está indicado en el [tratamiento de la infección por el VIH](#).

CÓMO TOMARLO



Siga la pauta que le ha indicado su médico/ farmacéutico. Lamivudina puede tomarse CON o SIN alimentos. Si tiene dificultad para tragar, puede deshacer el comprimido en un poco de agua, zumo de naranja o uva y tomarlo inmediatamente.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

CÓMO CONSERVARLO



A Tª ambiente (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Entre los efectos adversos comunicados con más frecuencia (más de 1 por cada 100 pacientes tratados) se encuentran: molestias gastrointestinales ([diarrea](#), [náuseas](#), [vómitos](#), [dolor abdominal](#)), [dolor de cabeza](#), [cansancio](#), [malestar](#), [insomnio](#), [tos](#), [síntomas nasales \(irritación, moqueo\)](#), [erupción cutánea](#), [pérdida de cabello](#) y [dificultad para dormir](#).

Preste especial atención a la aparición de respiración rápida, profunda, somnolencia y síntomas no específicos como náuseas, vómitos y dolor de estómago, que pueden indicar la aparición de un efecto adverso raro pero más grave denominado acidosis láctica (o acumulación de ácido láctico en el organismo). Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

¡ATENCIÓN!



▪ **Comunique cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural** que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de Lamivudina.

▪ Si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Se debe evitar la lactancia materna.

Y RECUERDE...

▪ Tomar esta medicación **no elimina el virus ni evita la transmisión a través de la sangre o contacto sexual**. Debe seguir tomando las precauciones apropiadas.

▪ **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.

▪ Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.

▪ No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

▪ Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

▪ Nuestro horario de dispensación es de lunes a jueves de 8:30 a 18:30h y los viernes de 08:30 a 14:30h. También puede contactar con nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 586 7714.

HORARIO DE MEDICACIÓN

DOSIS

CÓMO TOMARLO

Lamivudina comp

Desayuno

Comida

Cena

CON o SIN alimentos

**NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.



Servicio de Farmacia
Hospital General Universitario
Gregorio Marañón
Comunidad de Madrid

@farma_gregorio