

DOLUTEGRAVIR

TIVICAY® 50 mg comprimidos



Servicio de Farmacia
HGU Gregorio Marañón

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Dolutegravir es un inhibidor de la integrasa que está indicado, en combinación con otros fármacos antirretrovirales, en el **tratamiento de la infección por el VIH**.

CÓMO TOMARLO



Siga la pauta que le ha indicado su médico / farmacéutico. Tome los comprimidos enteros. No es recomendable masticar, machacar o partir los comprimidos. Puede tomarlos **CON** o **SIN** alimentos.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que queden menos de 4 horas para la siguiente dosis. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

CÓMO CONSERVARLO



A **Tª ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **dolor de cabeza, diarrea, náuseas, trastornos del sueño, mareo, cansancio y erupción cutánea**. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

¡ATENCIÓN!



- **Comuníquese cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural** que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de dolutegravir.
- Dolutegravir no debe administrarse conjuntamente con medicamentos **antiácidos** que contengan aluminio / magnesio (empleados para tratar la indigestión o el ardor de estómago), **suplementos de calcio o hierro** y preparados **multivitamínicos**. En caso de necesidad, tómelos al menos 6 horas antes de tomar Tivicay o por lo menos 2 horas después de tomarlo. La administración de dolutegravir con **dofetilida** (antiarrítmico) e **Hierba de San Juan** está contraindicada. También es especialmente importante que mencione el uso concomitante de **antiepilépticos** como la oxcarbamazepina, carbamazepina, fenitoína o fenobarbital y **antidiabéticos** como la metformina.
- Si está embarazada, comuníquese inmediatamente a su médico. Las mujeres embarazadas no deben tomar dolutegravir, salvo que se lo indique específicamente el médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

Y RECUERDE...

- Tomar esta medicación **no elimina el virus ni evita la transmisión a través de la sangre o contacto sexual**. Debe seguir tomando las precauciones apropiadas.
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.
- Nuestro horario de dispensación es de lunes a jueves de 8:30 a 18:30h y los viernes de 08:30 a 14:30h. También puede contactar con nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 586 7714.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
	De	Co	Ce	
Tivicay® 50 mg comp				CON o SIN alimentos

**NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

