TENOFOVIR
(Viread® 245 mg comprimidos)

Red H s H Hospitales sin Humo

Servicio de Farmacia
HGU Gregorio Marañón

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Tenofovir es un antiviral que está indicado, para el tratamiento de la infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB).

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER

Los más frecuentes son: diarrea, vómitos, náuseas, mareos, erupción, sentirse débil, sentirse hinchado, flatulencia, dolor de cabeza, disminución de los niveles de fosfato en sangre, y dolor muscular.

Consulte al médico si presenta: respiración acelerada, dificultad para respirar, nausea persistente, somnolencia y anomalía de los latidos del corazón.

CÓMO TOMARLO

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tome el medicamento siempre a la misma hora, con alimento.

Si **tiene dificultad para tragar** , puede deshacer el comprimido en al menos 100ml de agua o zumo.

Si **vomita** y no ha pasado una hora tras la toma, deberá repetir la dosis. Si ha pasado más de 1 hora, no repetir.

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO…

Cualquier medicamento, suplemento dietético o producto natural que esté tomando.

Si es intolerante a la lactosa.

Si quedara embarazada durante el tratamiento, informe inmediatamente. No debe dar el pecho durante el tratamiento.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA

Tómela tan pronto como sea posible.

Si ya quedan menos de 12 horas hasta su siguiente dosis, no tome la dosis que olvidó. Espere y tome la dosis siguiente a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO

A Tª ambiente (no superior a 30ºC). Evite la humedad, la luz directa y el calor.

Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original.

Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

Y RECUERDE…

- Tomar esta medicación no elimina el virus ni evita la transmisión a través de la sangre o contacto sexual. Debe seguir tomando las precauciones apropiadas. Existe una vacuna eficaz disponible para proteger a aquellos con riesgo de infección con el virus de la hepatitis B.
- Conducción y uso de máquinas: Tenofovir puede producir mareo y cansancio. Si nota mareo durante el tratamiento , no conduzca, ni monte en bicicleta, ni maneje máquinas.
- Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.
- En situación de urgencia o cirugía leve (dentista) informe a su médico de los medicamentos que está tomando.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.
- Nuestro horario de dispensación es de lunes a jueves de 8:30 a 18:30h y los viernes de 08:30 a 14:30h. También puede contactar con nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 586 7714.

HORARIO	DOSIS			CÓMO TOMARLO
	Desayuno	Comida	Cena	
Viread® 245mg				**Con alimento**

NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.