

ANFOTERICINA B 0,5%

Colirio 3 mL

Fórmula magistral

QUÉ ES



Composición por 3 mL

Anfotericina B liposomal 50 mg	15 mg
Agua para inyectables	3 mL

PARA QUÉ SE UTILIZA



Se utiliza para el tratamiento de las infecciones fúngicas de la superficie del ojo.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA ADMINISTRACIÓN



Adminístrese la dosis tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, espere a la siguiente administración. Nunca se lo administre dos veces para compensar el olvido.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Puede notar picor, enrojecimiento, visión borrosa, sensación de tener algo en el ojo o secreción excesiva de lágrimas. Comuníquelo a su médico si estos efectos persisten o empeoran. En caso de intoxicación, contacte con el 915620420 (S. Información Toxicológica).

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...



Si tiene alergia a algún medicamento o está utilizando algún otro tratamiento ocular (lágrimas artificiales etc). No use anfotericina colirio sin primero hablar con su médico si está usted embarazada. No se conocen los riesgos que podría tener para el bebé. Durante la lactancia habría que sopesar el beneficio/riesgo.


CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



Debe conservarlo en nevera y protegido de la luz. Una vez abierto, escribir la fecha de apertura y desechar el envase a los 7 días. No utilice el colirio después de la fecha de caducidad que figura en el envase.

Y RECUERDE...

- **Para administrarlo**, lávese las manos y colóquese frente al espejo. Agite suavemente el colirio. No toque el gotero ni lo ponga en contacto con su ojo. Eche la cabeza hacia atrás, sujete el párpado inferior y ponga el gotero justo por encima del ojo sin tocarlo. Administre la dosis prescrita.
- **Tras la administración**, cierre los ojos durante 1-2 minutos. Limpie con una gasa estéril el colirio que no entre y no se frote los ojos. Si tiene otro tratamiento ocular, espere al menos 15 minutos entre administraciones.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Nuestro horario de atención es de **lunes a jueves, de 8:30 a 18:30h** y **viernes de 8:30 a 14:30h**.
- Si va a continuar el tratamiento, le pedimos que nos avise siempre con **3 días de antelación** a la recogida de la medicación para programar la elaboración en el 91 586 8245.



HORARIO DE
MEDICACIÓN

DOSIS

**NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

