

CICLOSPORINA 1%

Colirio 5 mL

Fórmula magistral

QUÉ ES



Composición por 5 mL

Sandimmun® 50 mg/mL	50 mg
Aceite de oliva (acidez<0,5°)	csp 5 mL
Contiene etanol 13,9% y aceite de ricino polietoxilado	

PARA QUÉ SE UTILIZA



Se utiliza para reducir la respuesta inmunitaria en trasplante de cornea, queratopatía crónica autoinmune, queratoconjuntivitis vernal y otras patologías.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA ADMINISTRACIÓN



Adminístrese la dosis tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, espere a la siguiente administración. Nunca se lo administre dos veces para compensar el olvido.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Puede notar picor, enrojecimiento, visión borrosa, sensación de tener algo en el ojo o secreción excesiva de lágrimas. Comuníquelo a su médico si estos efectos persisten o empeoran. En caso de intoxicación, contacte con el 915620420 (S. Información Toxicológica).

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...



Si tiene alergia a algún medicamento o está utilizando algún otro tratamiento ocular (lágrimas artificiales etc). No use ciclosporina colirio sin primero hablar con su médico si está usted embarazada. No se conocen los riesgos que podría tener para el bebé. Evitar su uso durante la lactancia materna.


CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



Debe conservarlo a temperatura ambiente y protegido de la luz. Una vez abierto, escribir la fecha de apertura y desechar el envase a los 10 días. No utilice el colirio después de la fecha de caducidad que figura en el envase.

Y RECUERDE...

- **Para administrarlo**, lávese las manos y colóquese frente al espejo. Agite suavemente el colirio. No toque el gotero ni lo ponga en contacto con su ojo. Eche la cabeza hacia atrás, sujete el párpado inferior y ponga el gotero justo por encima del ojo sin tocarlo. Administre la dosis prescrita.
- **Tras la administración**, cierre los ojos durante 1-2 minutos. Limpie con una gasa estéril el colirio que no entre y no se frote los ojos. Si tiene otro tratamiento ocular, espere al menos 15 minutos entre administraciones.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con el colirio **lave la zona con agua** abundante.
- Nuestro horario de atención es de **lunes a viernes, de 8:30 a 14:30h y los miércoles por la tarde de 15:30 a 18:30h**.
- Los colirios se elaboran mensualmente en la receta le indicarán la fecha de la próxima dispensación.



HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS

**NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

