

## PARA QUÉ SE UTILIZA



Dabrafenib se utiliza en el tratamiento del **melanoma** no reseccable o metastásico con mutación de BRAF V600 positiva.

## CÓMO TOMARLO



Siga la pauta que le ha indicado su médico.

Tome las cápsulas enteras, sin masticarlas, ni abrirlas, ni diluirlas.

Deben tomarse en **ayunas (al menos 1 hora antes o 2 horas después de comer)**.

No debe tomar pomelo ni zumo de pomelo durante el tratamiento.

## QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que hayan pasado más de 6 horas desde el olvido. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

## QUÉ EFECTOS SECUNDARIOS PUEDEN APARECER



- Los efectos secundarios más frecuentes son: **fiebre, escalofríos, disminución del apetito, tos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, cansancio, dolor óseo y muscular y caída del pelo.**
- Consulte a su oncólogo si presenta una temperatura superior a 38,5°.
- Consulte a su oncólogo si presenta algún cambio en la piel (nuevas verrugas, llagas o bultos enrojecidos, en la piel cambios en los lunares) durante el tratamiento.
- Consulte a su médico si tiene enrojecimiento e irritación de los ojos, visión borrosa, dolor u otros cambios en la visión durante el tratamiento.

## CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



A **Tª ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor.

Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original.

Lávese las manos tras su manipulación.

Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

## Y RECUERDE...

- Si es una mujer fértil, o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe **utilizar medidas anticonceptivas dobles** hasta 4 semanas después de finalizar dabrafenib. Los anticonceptivos orales podrían interactuar con el tratamiento.
- Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos** (incluso los adquiridos sin receta) y productos naturales que esté tomando, ya que **dabrafenib puede interactuar con otros medicamentos** (ej. digoxina, warfarina, sintrom, carbamacepina, claritromicina, omeprazol, etc).
- Informe a su médico si tiene que interrumpir la medicación.**
- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada** a la farmacia del hospital.
- Nuestro horario de dispensación es de lunes a jueves de 8:30 a 18:30h y los viernes de 08:30 a 14:30h. También puede contactar con nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 586 7714.

| HORARIO DE MEDICACIÓN | DOSIS    |        |      | CÓMO TOMARLO                                  |
|-----------------------|----------|--------|------|---|
|                       | Desayuno | Comida | Cena |   |
| Tafinlar 50 mg        |          |        |      | 1 hora antes o 2 horas después de las comidas |
| Tafinlar 75 mg        |          |        |      |   |

**NO SE QUEDE CON DUDAS. PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

*En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.*

