

DEXAMETASONA

Suspensión 1 mg/ml

Frasco de 50 ml

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Este medicamento tiene muchas indicaciones: reacciones alérgicas graves, asma, enfermedades reumáticas, de piel, prevención de rechazo en trasplantes, colitis ulcerosa y para reemplazar esta sustancia cuando su cuerpo no la fabrica en suficiente cantidad.

CÓMO LO ELABORAMOS



Dexametasona.....100 mg
Jarabe simplecsp 100 mL
Esencia de melocotón2 gotas

Excipientes: contiene sacarosa (888 mg/ml).

CÓMO TOMARLO



Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tómelo **con alimentos**. En caso de dosis única diaria, administrar por las mañanas. Intente tomarlo siempre a la misma hora. **Agite bien la suspensión antes de administrarlo.**

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Consulte a su médico tan pronto como sea posible si nota aumento de la sensación de hambre o aumento de peso, nerviosismo, indigestión, dolor de estómago, náuseas, vómitos, problemas para conciliar el sueño, confusión, alteraciones en la visión, dolor de cabeza. Si estas reacciones se vuelven severas consúlteselo a su médico.

Avisé a su médico inmediatamente si sufre reacción alérgica, dificultad para respirar, hinchazón de pies o piernas, calambres musculares, vómitos con sangre, etc.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



Conservar **en nevera**. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...



Cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.

Y RECUERDE...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
Dexametasona	Desayuno	Comida	Cena	Con alimentos
				



**NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

