

# FLECAINIDA

Suspensión 5 mg/ml

Frasco de 50 ml

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Su médico le ha prescrito este medicamento para tratar las **arritmias cardiacas** (alteraciones del ritmo y frecuencia del latido del corazón).

## CÓMO LO ELABORAMOS



Flecainida (Apocard® C).500 mg  
 Metilcelulosa 1% .....50 mL  
 Jarabe simple .....csp 100mL  
 Esencia de Fresa .....2 gts  
 Excipientes: contiene sacarosa (444mg/ml), almidón (sin gluten), benzoato de sodio y metilparaben

## CÓMO TOMARLO



Siga la pauta que le ha indicado su médico. Se puede tomar **con o sin alimentos**, aunque los alimentos disminuyen el riesgo de molestias en el estómago. Separe su administración de lácteos (leche, leches infantiles). **Agitar** bien la suspensión antes de administrarlo.

## QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Los efectos adversos más frecuentes son: mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, pérdida de apetito, debilidad o problemas de visión. Consulte inmediatamente a su médico si presenta latido cardíaco irregular, dolor en el pecho, dificultades respiratorias, fiebre, reacciones alérgicas, color amarillento de ojos y piel. Por contener benzoato sódico como excipiente, puede irritar ligeramente los ojos, la piel y las mucosas. Puede aumentar el riesgo de coloración amarillenta (ictericia) en recién nacidos. Si aprecia cualquier efecto adverso que no hemos mencionado informe a su médico.

## QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

## CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



Conservar **en nevera**. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

## COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...



Cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.

## Y RECUERDE...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
Flecainida	Desayuno 	Comida 	Cena 	Con/sin alimentos



**NO SE QUEDE CON DUDAS.  
 PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

*En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.*

