MITOMICINA 0,01%
Colirio 10 mL
Fórmula magistral

QUÉ ES

Composición por 10 mL

Mitomicina	1 mg
Suero fisiológico 0,9%	2mL
Agua para inyección	8mL

PARA QUÉ SE UTILIZA

Se utiliza para el tratamiento de las neoplasias corneales y conjuntivales, glaucoma refractario y en el postoperatorio de cirugía de pterigion.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA ADMINISTRACIÓN

Adminístrese la dosis tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, espere a la siguiente administración
Nunca se lo administre dos veces para compensar el olvido.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER

Puede notar picor, enrojecimiento, visión borrosa, sensación de tener algo en el ojo o secreción excesiva de lágrimas.
Comuníquele a su médico si estos efectos persisten o empeoran.
En caso de intoxicación, contacte con el 915620420 (S. Información Toxicológica).

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...

Si tiene alergia a algún medicamento o está utilizando algún otro tratamiento ocular (lágrimas artificiales etc).
No use mitomicina colirio sin primero hablar con su médico si está usted embaraza. No se conocen los riesgos que podría tener para el bebe.
Evitar su uso durante la lactancia materna.

CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO

Debe conservarlo en nevera y protegido de la luz.
Una vez abierto, escribir la fecha de apertura y desechar el envase a los 7 días.
No utilice el colirio después de la fecha de caducidad que figura en el envase.

Y RECUERDE...



- Para administrarlo, lávese las manos y colóquese frente al espejo. Agite suavemente el colirio. No toque el gotero ni lo ponga en contacto con su ojo. Eche la cabeza hacia atrás, sujete el párpado inferior y ponga el gotero justo por encima del ojo sin tocarlo. Administre la dosis prescrita. Es recomendable la utilización de guantes, sobre todo si se lo va administrar otra persona.
- Tras la administración, cierre los ojos durante 1-2 minutos. Limpie con una gasa estéril el colirio que no entre y no se frote los ojos. Si tiene otro tratamiento ocular, espere al menos 15 minutos entre administraciones.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento es citotóxico. En caso de contacto con el colirio lave la zona con agua abundante.
- Nuestro horario de atención es de lunes a jueves, de 8:30 a 18:30h y los viernes de 8:30 a 14:30 h.
- Si va a continuar el tratamiento, le pedimos que nos avise siempre con 3 días de antelación a la recogida de la medicación para programar la elaboración en el 91 586 8195.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS

NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.