

# NEVIRAPINA

NEVIRAPINA 200 mg comprimidos  
VIRAMUNE® 50 mg/5 ml suspensión oral 240 mL

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Nevirapina es un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inversa que está indicado, en combinación con otros fármacos antirretrovirales, en el **tratamiento de la infección por el VIH**.

## CÓMO TOMARLO



Siga la pauta que le ha indicado su médico / farmacéutico. Confirme si se le ha pautado la mitad de dosis (1 comprimido al día) durante los primeros 14 días. Puede tomarlo **CON o SIN ALIMENTOS**. No masticar ni triturar el comprimido.

## QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Si se da cuenta de que ha olvidado una dosis dentro de las 8 horas posteriores a la hora programada, tome la dosis lo antes posible y siga con el horario habitual. De lo contrario, espere a la siguiente dosis. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

## CÓMO CONSERVARLO



A **Tª ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

## QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



- Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **erupción leve, dolor de cabeza, malestar general, vómitos, dolor abdominal, diarrea, cansancio, fiebre**. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.
- Durante las primeras 18 semanas de tratamiento es muy importante que usted y su médico vigilen la aparición de reacciones hepáticas o cutáneas. Debe interrumpir inmediatamente el tratamiento y comunicárselo a su médico en caso de:
  - Síntomas importantes de alergia (que puede manifestarse como erupción grave, hinchazón de la cara, dificultad para respirar, fiebre, malestar general).
  - Síntomas que sugieran daño en el hígado, tales como pérdida de apetito, náuseas, vómitos, coloración amarilla de la piel, dolor abdominal.

## ¡ATENCIÓN!



- Los comprimidos contienen lactosa. Informe a su médico o farmacéutico si padece intolerancia a la lactosa u otros azúcares.
- Comunique cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando**, pues pueden interferir con el efecto de nevirapina. Es especialmente importante que mencione el uso de anticonceptivos o terapia hormonal (su eficacia puede verse reducida), anticoagulantes, antibióticos y antifúngicos. No tome Hierba de San Juan durante el tratamiento.
- Si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Se debe evitar la lactancia materna.

## Y RECUERDE...

- Tomar esta medicación **no elimina el virus ni evita la transmisión a través de la sangre o contacto sexual**. Debe seguir tomando las precauciones apropiadas.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.
- Nuestro horario de dispensación es de lunes a jueves de 8:30 a 18:30h y los viernes de 08:30 a 14:30h. También puede contactar con nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 586 7714.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
	De	Co	Ce	
Nevirapina® 200 mg comp				CON o SIN alimentos. Confirme si se le ha pautado la mitad de dosis los primeros 14 días.
Viramune® suspensión				

**NO SE QUEDE CON DUDAS.  
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

*En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.*

