

PREDNISONA

5 mg/mL suspensión 50 mL

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Este medicamento tiene muchas indicaciones entre ellas es utilizado en reacciones alérgicas graves, asma, enfermedades reumáticas, de piel, prevención de rechazo en trasplantes, colitis ulcerosa y para reemplazar esta sustancia cuando su cuerpo no la fabrica en suficiente cantidad

CÓMO TOMARLO



Tómelo **con comidas**, siempre del mismo modo y a la misma hora. **Agite bien** la suspensión antes de administrarlo. Tome el medicamento tal y como le ha sido prescrito. No suspenda la medicación ni modifique la dosis sin consultarlo con su médico.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tome la dosis que ha olvidado lo antes posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo haga y continúe con su pauta habitual. Nunca tome el doble de dosis para compensar la dosis olvidada.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Puede presentar aumento de la sensación de hambre, aumento de peso, nerviosismo, dolor de estómago, náuseas, vómitos, problemas para conciliar el sueño, confusión, alteraciones en la visión, dolor de cabeza. Si estas reacciones se vuelven severas consúlteselo a su médico.

Avise a su médico inmediatamente si sufre reacción alérgica, dificultad para respirar, hinchazón de pies o piernas, calambres musculares, vómitos con sangre, pérdida de visión. Si aprecia cualquier efecto adverso que no hemos mencionado informe a su médico.

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...



Cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.

CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



Conservar en **nevera**.

Y RECUERDE...

- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.**
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

CÓMO LO ELABORAMOS



Prednisona.....500 mg
Agua para laboratorio.....3 MI
Esencia de Naranja 10 gts
Jarabe simplec.s.p. 100 ml

Excipientes:
sacarosa (843 mg/ml) y
metilparaben

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
	Desayuno	Comida	Cena	
Prednisona				Con alimentos



NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

