

RANITIDINA

5 mg/ml solución

Jeringa oral 5 ml

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Su médico se lo ha pautado para el tratamiento o la prevención de alteraciones gastrointestinales como úlceras y/o para tratar una producción excesiva de ácido gástrico.

CÓMO TOMARLO



Lo puede tomar **con o sin alimentos**. Intente tomarlo siempre a la misma hora. En dosis única administrar preferiblemente al acostarse. Tome el medicamento tal y como le ha sido prescrito. No suspender.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tome la dosis que ha olvidado lo antes posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo haga y continúe con su pauta habitual. Nunca tome el doble de dosis para compensar la dosis olvidada.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Avisé a su médico inmediatamente si aparecen síntomas de alergia, dificultad para respirar, coloración amarilla de piel y mucosas, visión borrosa, mareos, cambios en la cantidad y color de la orina.

Si aprecia cualquier efecto adverso que no hemos mencionado informe a su médico.

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...



Cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.

CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



Conservar en nevera.

Y RECUERDE...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

CÓMO LO ELABORAMOS



Ranitidina.....500 mg
 Agua conservans.....50 mL
 Jarabe simple50 mL

Excipientes:
 este medicamento contiene
 sacarosa (444 mg/mL) y
 metilparaben

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
	Desayuno	Comida	Cena	
Ranitidina				Con/sin alimentos



NO SE QUEDE CON DUDAS.
 PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

