

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Ribavirina es un medicamento antiviral que está indicado, en combinación con otros medicamentos, en el **tratamiento de la infección por el VHC**.

## CÓMO TOMARLO



Debe tomarlo todos los días **con alimentos**, en dos tomas. Separe las tomas 12 horas. Se recomienda que lo tome después del desayuno y la cena con un vaso de agua.

Las comprimidos no se deben triturar.

## QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómelo lo antes posible y continúe con su horario habitual. Pero si está cercana a la hora de la siguiente dosis, no tome la dosis olvidada y tome la que le corresponda. **Nunca debe tomar la cantidad de dos tomas juntas.**

## QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **anemia, cansancio excesivo, mareos, insomnio, dolor de cabeza, confusión, pérdida de apetito, caída del pelo, sequedad de piel, dolor muscular, falta de aire**. Si nota **dolor en el pecho**, comuníquelo a su médico cuanto antes.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

## RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE REACCIONES ADVERSAS



**Picor y/o sequedad en la piel:** Utilice jabones neutros y cremas hidratantes/emolientes. Evite duchas demasiado calientes. Evite la exposición al sol. Beba abundantes líquidos para hidratar la piel.

**Cansancio:** Intente realizar sus actividades cotidianas. No conduzca ni utilice máquinas peligrosas

**Náuseas y/o diarrea:** Intente comer menos cantidades en más tomas durante el día. Evite las comidas muy calientes, grasas y/o con picantes. No tome café o bebidas con cafeína. Evite acostarse justo después de haber comido (espere al menos 1 hora)

## COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...



Cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.

La ribavirina puede provocar daños en el feto. Por ello **se debe evitar un embarazo** durante el tratamiento y hasta 6 meses después de finalizarlo. Evite la lactancia materna.

## CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



A **Tª ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original.

Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

## Y RECUERDE...

- Para evitar la transmisión a través de la sangre o contacto sexual, debe seguir tomando las precauciones apropiadas.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.** La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.
- Acuda el día y a la hora de su cita programada. También puede contactar con nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 586 7714.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS	CÓMO TOMARLO
	De	Ce
Ribavirina 200 mg comprimidos		CON alimentos

**NO SE QUEDE CON DUDAS. PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

*En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.*

