

MANEJO DE ADENOPATIAS EN URGENCIAS

Revisado por S. Urgencias,
oncología e infecciosas del infantil
del HGUGM.
Febrero 2004

ETIOLOGÍA

- **Infecciosa**
 - Bacteriana:
Causa más frecuente (65-89%) de adenitis cervical.
Streptococo grupo A, S. aureus, Salmonella, Brucella, TBC, sífilis
 - Vírica: VEB, CMV, hepatitis, rubéola, varicela, herpes, adenovirus, SIDA
 - Toxoplasma, paludismo, hongos.
- **Inmunoalérgicas:**
AR, LES, Kawasaki, hidantoinas, eczema del lactante.
- **Neoplasias:**
Linfoma, leucemia, SMP, metástasis
- **Endocrinas**
Hipertiroidismo, Addison
- **Otras:** Gaucher, sarcoidosis, Nieman Pick.

iiiiSIGNOS DE ALARMA!!!!

- **Inicio en el periodo neonatal >0.5cm.**
- **Tamaño mayor de 3 cm según autores.**
- **Rápido crecimiento y/o progresivo.**
- **Ulceración cutánea o fijación a planos profundos.**
- **Síndrome febril de más de 1 semana de evolución.**
- **Perdida de peso de más del 10%.**
- **Síndrome hemorrágico.**
- **Hepatoesplenomegalia.**
- **Localización supraclavicular, epitrocLEAR y poplitea**

Teniendo en cuenta estos datos se identifican las 4/5 partes, dejando solamente un 0.3% que no se reconoce en una primera actuación.

CLASIFICACION SEGÚN LOCALIZACION

	CAUSAS	DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
OCCIPITAL	Pediculosis, escabiosis, dermatitis seborreica, rubéola, impétigo, dermatitis atópica.	Quiste dermoide, lipoma
PREAURICULAR	conjuntivitis, blefaritis, enf arañazo de gato, otitis, TBC, herpes	quiste de primer arco branquial, y patología de región parotídea
CERVICAL	Localización más frecuente. Causas mas frecuentes: 1º infección de vías respiratorias 2º etiología bacteriana Descartar patología de región orofaríngea: faringoamigdalitis, estomatitis, absceso retrofaríngeo, aftas, patología dental.	Costilla cervical, quiste tirogloso, fibromas, masa tiroidea.
SUPRACLAVICULAR	Procesos intraabdominales derechos (por conducto torácico), masa mediastínica y pulmonares. 50% patología tumoral (+ fr linfomas)	
MEDIASTINICA	TBC, hongos, sarcoidosis, linfomas	neuroblastoma, timo, bocio
AXILAR	Infección en brazo, mano (onicofagia), enf arañazo de gato, AR, metástasis.	
EPITROCLEAR, POPLITEA	Descartar afectación de órganos vecinos. Linfomas	
GENERALIZADAS	VEB, CMV, HIV, Toxoplasmosis, Kawasaki, linfomas, artritis reumatoide.	

Criterios de adenopatías patológicas:

- a) Adenopatías en el recién nacido de cualquier localización > 0,3-0,5 cm de tamaño.
- b) Adenopatías cervicales o inguinales > 1,5-2 cm en edad inferior a 14 años.
- c) Adenopatías de otras localizaciones > 0,5-1 cm en cualquier edad.

ENFOQUE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO DE ADENOPATÍA CERVICAL

