


MANEJO DEL NIÑO CON INFECCIÓN DE ORINA

**Revisión Enero 2009:
VIA CLINICA**

Infección del Tracto Urinario Alta



DOSIS ANTIBIÓTICOS

ITU ALTA

- AMPICILINA: 100 mg/Kg/día cada 6 horas
- CEFOTAXIMA: 150 mg/Kg/día cada 8 horas
- CEFTRIAXONA: 50 mg/Kg/día cada 24 horas
- GENTAMICINA: 5mg/Kg/día cada 24 horas
- CEFIXIMA (vía oral): 16 mg/kg/día c 12 horas el primer día, luego 8 mg/Kg/día c cada 12 horas (DENVAR® susp. 100 mg/5ml, NECOPEN® susp. 100 mg/5ml)

ITU BAJA durante 3-4 días.

- NITROFURANTOINA: 5 mg/kg/día cada 6 horas. Furantoina® suspensión 50 mg en 5 ml. Comprimidos de 50 mg.
 - FOSFOMICINA: 100-200 mg/kg/día cada 8 horas. Fosfocina®: suspensión 250 mg en 5 ml. Administrar en ayunas.
 - FOSFOMICINA-TROMETAMOL. En niños entre 6-12 años 1 sobre de 2 gramos cada 24 horas 3 días, niños > a 12 años 1 sobre de 3 gramos cada 24 horas 3 días. Monurol® sobres de 2g y de 3 gramos.
 - AMOXICILINA-CLAVULANICO: 40 mg/Kg/día cada 8 horas (Amugmentine 100: 100 mg/1 ml)
- Tratamientos alternativos: cefalosporinas de 1ª y 2ª generación.