

Golimumab (SIMPONI® pluma)



Servicio de Farmacia
HGU Gregorio Marañón

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Es un inhibidor del TNF- α que actúa disminuyendo la inflamación en enfermedades crónicas autoinmunes como **artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial no radiológica, artritis psoriásica y colitis ulcerosa.**

CÓMO ADMINISTRARLO

Golimumab se administra por vía subcutánea los días que le indique su médico. Saque la jeringa de la nevera media hora antes de la administración. Se recomienda variar el lugar en cada administración para evitar que la piel se irrite.



CÓMO CONSERVARLO

Conserve la medicación en la nevera (2°C - 8°C) (NUNCA en el congelador) y en su caja original para protegerlo de la luz. Si ha tenido algún problema con la conservación en la nevera y la medicación a alcanzado temperatura ambiente, debe saber que Erelzi puede ser conservado a una temperatura máxima de 25 °C durante un único periodo de hasta 4 semanas, pudiendo utilizar las plumas durante este periodo.

Una vez utilizadas las plumas, tírelas al contenedor amarillo que le hemos dado en la Farmacia del Hospital. Cuando esté lleno a 2/3 de su capacidad, ciérrelo bien y entréguelo en la Farmacia para su adecuada destrucción.

QUÉ HACER SI SE LE OLVIDA

Si se olvida una dosis, adminístresela tan pronto como sea posible y continúe con su calendario habitual. Si la dosis olvidada está más próxima a la siguiente administración, consulte con su médico cuándo administrarla.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER

- En el punto de la piel donde ha inyectado la medicación puede aparecer eritema, urticaria, induración, dolor, hematoma, prurito, irritación o parestesias. Es muy frecuente (>10%) la aparición de infecciones del tracto respiratorio superior (nasofaringitis, faringitis, laringitis y rinitis). También podrían aparecer con menor frecuencia (>1%) neumonía, infecciones bacterianas, víricas o fúngicas, bronquitis, sinusitis, celulitis, anemia, reacciones alérgicas (broncoespasmos, hipersensibilidad, urticaria), asma, depresión, insomnio, mareos, cefalea, parestesia, hipertensión, náuseas, molestias gastrointestinales y alteraciones gastrointestinales inflamatorias (gastritis y colitis), estomatitis, aumento de transaminasas, prurito, rash, alopecia, dermatitis y fracturas óseas.
- Golimumab afecta al sistema inmunitario pudiendo afectar a las defensas del paciente frente a infecciones, neoplasias o a la respuesta adecuada a determinadas vacunas. Antes del inicio de tratamiento deben ser descartadas infecciones latentes como tuberculosis o hepatitis B. Debe acudir a su médico o a Urgencias si presenta síntomas de infección (fiebre, tos persistente, debilidad, pérdida de peso...) durante el tratamiento. Debe avisar a su médico antes de ponerse una vacuna.
- No se debe utilizar Golimumab durante el embarazo. Se debe utilizar anticoncepción efectiva y evitar la lactancia materna durante el tratamiento y hasta 6 meses después de la última dosis.

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO SI:

- Está tomando otros medicamentos, con o sin receta, suplementos dietéticos o productos naturales.
- Tiene alergia al látex. Si tiene intolerancia hereditaria a la fructosa ya que contiene sorbitol (E420).
- Tiene alguna enfermedad del corazón.
- Tiene programada alguna operación quirúrgica (incluye cirugía dental).



Y RECUERDE...

- No utilice el medicamento una vez superada la fecha de caducidad. Devuelva la medicación no utilizada a la Farmacia
- Golimumab se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarles aunque tengan síntomas similares a los suyos.
- Mantenga este medicamento y el contenedor de agujas fuera de la vista y del alcance de los niños.
- Para recoger su medicación es necesario presentar la Tarjeta Sanitaria y la receta en vigor (revise que la fecha de validez sea posterior al día en curso, en caso contrario deberá acudir a su médico para que le renueve la receta).
- Nuestro horario de dispensación es de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el Servicio de Farmacia del CEIMI (C/ Francisco Silvela, 40, 6ª planta). Debe acudir a recoger su medicación el día y la hora de su cita programada. Si no pudiera acudir el día de su cita, le rogamos que llame lo antes posible al teléfono 914269366 para cambiarla. En horario de tarde puede recoger su medicación en el Servicio de Farmacia del Hospital Gregorio Marañón, de lunes a jueves de 14:30h a 18:30h.
- Para cualquier consulta sobre su tratamiento puede llamarnos de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 914269271 o escribir a la dirección de correo electrónico: farmacia.ceimi.hgum@salud.madrid.org

NO SE QUEDE CON DUDAS. PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y su calidad de vida.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 91 4269271

www.madrid.org/hospitalgregoriomarañon/farmacia



@farma_gregorio