

Risankizumab (SKYRIZI® jeringa)



Servicio de Farmacia
Centro de Enfermedades Inmunomediadas (CEIMI)
HGU Gregorio Marañón



QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Es un inhibidor del la IL-23 que actúa disminuyendo la inflamación en enfermedades como la **psoriasis**.

CÓMO ADMINISTRARLO

Risankizumab se debe administrar por **vía subcutánea el primer día, a los 28 días y después continuar cada 84 días (12 semanas)**. Se deben administrar dos jeringas juntas, a no ser que su médico le indique lo contrario. Saque las jeringas de la nevera entre 15 - 30 minutos antes de la administración. Se recomienda administrarlo en zonas de la piel no irritadas.



CÓMO CONSERVARLO

Conserve la medicación en la nevera (NUNCA en el congelador) y en su caja para protegerlo de la luz. Una vez utilizadas las jeringas, tírelas al contenedor que le hemos dado. Cuando esté lleno a 2/3 de su capacidad, ciérrelo bien y entréguelo en la Farmacia para su adecuada destrucción.



QUÉ HACER SI SE LE OLVIDA

Si se olvida una dosis, adminístresela tan pronto como sea posible y continúe con su calendario habitual. Si la dosis olvidada está más próxima a la siguiente administración, consulte con su médico cuándo administrarla.



QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER

- Este fármaco al sistema inmunitario pudiendo afectar a las defensas del paciente frente a infecciones. Antes del inicio de tratamiento deben ser descartadas infecciones latentes.
- Podrían aparecer infecciones del tracto respiratorio superior. Debe acudir a su médico o a Urgencias si presenta síntomas de infección (fiebre, tos persistente o dificultad para respirar) durante el tratamiento.
- Podrían aparecer dolor de cabeza, cansancio, prurito o dolor en la zona de inyección.
- No se debe utilizar durante el embarazo. Se debe utilizar anticoncepción efectiva durante el tratamiento y hasta 21 semanas después de la última dosis. Se desconoce si risankizumab se excreta en la leche materna, habría que valorar si se utiliza durante la lactancia materna.



COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO SI:

- Está tomando otros medicamentos, con o sin receta, suplementos dietéticos o productos naturales.
- Tiene programada alguna operación quirúrgica o cita con su dentista.
- Tiene que ponerse una vacuna.



Y RECUERDE...

- No utilice el medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la Farmacia del Hospital en condiciones adecuadas de conservación.
- Si tiene algún problema con la jeringa y no puede ponérsela, **NO LA TIRE**, devuélvala a la Farmacia del Hospital.
- Risankizumab se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarles aunque tengan síntomas similares a los suyos.
- Mantenga este medicamento y el contenedor de agujas fuera de la vista y del alcance de los niños.
- Para recoger su medicación es necesario presentar **la Tarjeta Sanitaria y la receta en vigor**. Revise que no está caducada, en caso contrario deberá acudir a su médico para que le renueve la receta.
- Nuestro horario de dispensación es **de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el Servicio de Farmacia del CEIMI (C/ Francisco Silvela, 40, 6ª planta)**. **Debe acudir a recoger su medicación el día y la hora de su cita programada**. Si no pudiera acudir el día de su cita, le rogamos que llame al teléfono **914269366 para cambiarla**. En horario de tarde puede recoger su medicación en el Servicio de Farmacia del Hospital Gregorio Marañón, de lunes a viernes de 14:30h a 18:30h.
- Para cualquier consulta sobre su tratamiento puede llamarnos de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 914269271 o escribir a la dirección de **correo electrónico: farmacia.ceimi.hgugm@salud.madrid.org**.

NO SE QUEDE CON DUDAS. PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

PARA MÁS INFORMACIÓN **914269271**

www.madrid.org/hospitalgregoriomaranon/farmacia



Servicio de Farmacia
Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

Comunidad de Madrid



@farma_gregorio