

TOFACITINIB

(XELJANZ® comprimidos)



Servicio de Farmacia
HGU Gregorio Marañón



QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Es un inhibidor potente y selectivo de la familia de las enzimas JAK que actúa modulando la respuesta inmune e inflamatoria en enfermedades crónicas como la **artritis reumatoide**.

CÓMO ADMINISTRARLO

Tofacitinib se administra por vía oral. La pauta habitual es de un comprimido de 5 mg tomado 2 veces al día, separados por un intervalo de 12 horas. Puede tomar los comprimidos con o sin alimentos. Si tiene dificultad para tragar, puede triturar los comprimidos y tomarlos con agua.

QUÉ HACER SI SE LE OLVIDA UNA TOMA



Si se olvida una dosis, tómela tan pronto como sea posible y continúe con su calendario habitual. Si la dosis olvidada está más próxima a la siguiente toma, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



- Es frecuente (1-10%) la aparición de infecciones, incluyendo neumonía, gripe, Herpes zóster, infección del tracto urinario, sinusitis, bronquitis, nasofaringitis y/o faringitis. También podrían aparecer anemia, cefalea, hipertensión, tos, dolor abdominal, vómitos y/o náuseas, diarrea, gastritis, dispepsia, erupción cutánea, artralgia y/o edema periférico.
- Tofacitinib afecta al sistema inmunitario pudiendo afectar a las defensas del paciente frente a infecciones, neoplasias o a la respuesta adecuada a determinadas vacunas. Antes del inicio de tratamiento deben ser descartadas infecciones latentes como tuberculosis o hepatitis víricas.
- Debe acudir a su médico o a Urgencias si presenta síntomas de infección (fiebre, tos persistente, debilidad, pérdida de peso...) durante el tratamiento.
- Debe avisar a su médico antes de ponerse una vacuna.
- No se debe utilizar Tofacitinib durante el embarazo. Se debe utilizar anticoncepción efectiva y evitar la lactancia materna durante el tratamiento y hasta al menos 4 semanas después de la última dosis.

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO SI:



- Está tomando otros medicamentos, con o sin receta, suplementos dietéticos o productos naturales.
- Tiene alergia a la lactosa. Si tiene intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de absorción de glucosa o galactosa no debe tomar este medicamento.
- Tiene programada alguna operación quirúrgica (incluye cirugía dental).

Y RECUERDE...

- No utilice el medicamento una vez superada la fecha de caducidad. Devuelva la medicación no utilizada a la Farmacia.
- Tofacitinib se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarles aunque tengan síntomas similares a los suyos.
- Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
- Para recoger su medicación es necesario presentar la Tarjeta Sanitaria y la receta en vigor (revise que la fecha de validez sea posterior al día en curso, en caso contrario deberá acudir a su médico para que le renueve la receta).
- Nuestro horario de dispensación es de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el Servicio de Farmacia del CEIMI (C/ Francisco Silvela, 40, 6ª planta). Debe acudir a recoger su medicación el día y la hora de su cita programada. Si no pudiera acudir el día de su cita, le rogamos que llame lo antes posible al teléfono 914269366 para cambiarla. En horario de tarde puede recoger su medicación en el Servicio de Farmacia del Hospital Gregorio Marañón, de lunes a jueves de 14:30h a 18:30h.
- Para cualquier consulta sobre su tratamiento puede llamarnos de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 914269271 o escribir a la dirección de correo electrónico: farmacia.ceimi.hgugm@salud.madrid.org

NO SE QUEDE CON DUDAS. PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

PARA MÁS INFORMACIÓN: **914269271**
www.madrid.org/hospitalgregoriomarañon/farmacia



Servicio de Farmacia
Hospital General Universitario
Gregorio Marañón
Comunidad de Madrid
[@farma_gregorio](https://twitter.com/farma_gregorio)